

ic ボルドー一覧表

種 類	66D	48Q	412
塩基性硫酸銅(%)	28.1	31.2	35.0
性 状	青色水和性粘稠懸濁液体		
急性毒性	普通物相当		
魚 毒 性	B類相当	B類相当	A類相当
作 物 適 用 病 害 希 釈 倍 数	<ul style="list-style-type: none"> ●ぶどう(べと病): 25~100倍 ●うめ(かいよう病): 50倍 *葉芽発芽前まで ●おうとう(せん孔細菌病): 40倍 ●キウイフルーツ(かいよう病): 50倍 	<ul style="list-style-type: none"> ●なし(黒星病): 30倍 *収穫後~開花前 	<ul style="list-style-type: none"> ●りんご(斑点落葉病): 20~50倍 ●もも(せん孔細菌病): 30~50倍 ●かき(落葉病): 50倍 ●すもも(黒斑病・かいよう病): 30倍 ●マルメロ(ごま色斑点病): 30倍

- 注** ① 一旦凍結させると、解凍しても粒子が粗くなって噴霧器が目詰まりするのでご注意ください。
- ② 殺ダニ剤、有機リン剤は現在慣行ボルドー液で使用している物のみご使用下さい。
- 意** ③ 取り扱い上の注意事項をよく読んだ上でご使用下さい。