

# パセリ登録農薬適用表

登録内容は2021年10月1日現在

用途	毒劇	RAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100%調整時 薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌消毒	劇	FRAC M3 RAC 8	ガスタード微粒剤	播種又は定植21日前まで	1回	30 kg	—	疫病、苗木枯病(リソクトニア菌)、萎凋病、 一年生雑草	—	—	微粒剤	土壌混和	ダゾメット	
	劇	RAC 8	クロールピクリン	—	1回	1穴当り3ml	—	立枯病、一年生雑草	—	—	くん蒸剤	土壌くん蒸	クロルピクリン	

用途	毒劇	FRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100%調整時 薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
殺菌剤		M1	キノドール粒剤	播種前 生育期(収穫90日前まで)	1回 1回	20 kg	— —	軟腐病	—	—	粒剤	土壌表面散布 (露地栽培)	有機銅	露地栽培登録
		1	ベンレート水和剤	収穫45日前まで	2回以内	1,000倍(3ℓ/1㎡)	100g	立枯病	○	○	水和剤	灌注	ベノミル	
		11、4	ユニフォーム粒剤	収穫21日前まで	3回以内	12 kg	—	疫病	—	—	粒剤	株元散布	アゾキシストロビン、 メタラキシルM	
		11	ストロビーフロアブル	収穫14日前まで	1回	3,000倍(100~300ℓ)	33ml	うどんこ病	○	○	フロアブル	散布	クレソキシムメチル	
		31	スターナ水和剤	収穫14日前まで	2回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50g	軟腐病	○	○	水和剤	散布	オキリニック酸	
		M1	ヨネボン(乳剤)	収穫14日前まで	3回以内	700倍(100~300ℓ)	143ml	うどんこ病、軟腐病、斑点病、アブラムシ類	○	×	乳剤	散布	ノニルフェノールスルホン酸銅	
		M1	Zボルドー	—	—	800倍(100~300ℓ)	125g	軟腐病	○	×	水和剤	散布	塩基性硫酸銅	
		3	スコア顆粒水和剤	収穫3日前まで	2回以内	2,000倍(200~400ℓ)	50g	うどんこ病	○	○	顆粒水和剤	散布	ジフェノコナゾール	
	7	アフエットフロアブル	収穫3日前まで	2回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	うどんこ病	○	×	フロアブル	散布	ベンチオピラド		

用途	毒劇	IRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率(10a当り使用量)	100%調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
殺虫剤	劇	1	ランネート45DF	収穫30日前まで	1回	2,000倍(100~300ℓ)	50g	アブラムシ類	速	短	顆粒水和剤	散布	メソミル	
		4	アドマイヤー1粒剤	定植時 は種時 収穫14日前まで	1回	0.5g/株 3kg	— —	アザミウマ類 アブラムシ類	— —	— —	粒剤	植穴土壌混和 播溝散布 株元散布	イミダクロプリド	
	劇	4	アドマイヤーフロアブル	収穫14日前まで	1回	4,000倍(100~300ℓ)	25ml	アブラムシ類	中	長	フロアブル	散布	イミダクロプリド	
		4	ダントツ水溶剤	収穫14日前まで	1回	4,000倍(100~300ℓ)	25g	アブラムシ類	中	長	水溶剤	散布	クロチアニジン	
	劇	4	モスピラン顆粒水溶剤	収穫3日前まで	1回	8,000倍(100~300ℓ)	13g	アブラムシ類	中	長	顆粒水溶剤	散布	アセタミプリド	
		28、4	ジュリボフロアブル	育苗期後半~定植当日	1回	200倍セル成型育苗トレイ1箱(約 30×60cm、使用土壌約1.5~4ℓ当 り0.5ℓ)	—	ハスモンヨウ	速	長	フロアブル	灌注	クロシラニリアール、 チアトキサム	灌注処理
		28	プレバソフロアブル5	収穫7日前まで	1回	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	速	長	フロアブル	散布	クロラントラニプロール	
	劇	3A	フォース粒剤	播種又は定植時	1回	4kg	—	ネキリムシ類	—	—	粒剤	播種、植溝又は全 面土壌混和	テフルトリン	
		3	アーデント水和剤	収穫7日前まで	3回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100g	ネギアザミウマ	速	中	水和剤	散布	アクリナトリン	
		3	テルスター水和剤	収穫3日前まで	2回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100g	アブラムシ類	速	中	水和剤	散布	ビフェントリン	
		3	ガードベイトA	収穫前日まで	3回以内	3kg	—	ネキリムシ類	—	—	粒剤	株元散布	ベルメトリン	
		5	スピノエース顆粒水和剤	収穫14日前まで	2回以内	2,500倍(100~300ℓ)	40g	ヨトウムシ	速	短	顆粒水和剤	散布	スピノサド	
		15	カスケード乳剤	収穫7日前まで	1回	4,000倍(100~300ℓ)	25ml	ハスモンヨトウ	遅	長	乳剤	散布	フルフェノクスロン	
		6	アフーム乳剤	収穫7日前まで	1回	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	ハスモンヨトウ	速	短	乳剤	散布	エマメクシン安息香酸塩	
		6	コロマイト乳剤	収穫3日前まで	1回	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	ハダニ類	速	短	乳剤	散布	ミルベメクシン	幼虫・成虫・殺卵効果○ セリ科葉菜類登録
		18	マトリックフロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	ハスモンヨトウ	中	中	フロアブル	散布	クロマフェノジド	
	29	ウララDF	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50g	アブラムシ類	遅	長	顆粒水和剤	散布	フロニカミド		

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
茎葉除草剤 (非選択性)		クレマト乳剤	播種後発芽前(雑草発生前)	200~400ml(100~150ℓ)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ブタミホス	
		バスタ液剤	収穫3日前まで(雑草生育期 定植前、又は畦間処理)	300~500ml(100~150ℓ)	2回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グルホシネート	
	毒	プリグロックスL	播種前又は植付前 雑草生育期但し、収穫7日前まで(畦間処理)	600~1,000ml(100~150ℓ)	3回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	ジクワット、パラコート	