

ズッキーニ登録農薬適用表

登録内容は2021年10月1日現在

用途	毒劇	FRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	1000調整時薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
殺菌剤		1	ネマトリンエース粒剤	定植前	1回	20kg	—	ネコフセンチュウ	—	—	粒剤	全面土壌混和	ホスチアゼート	被覆やガス抜き作業なし
		1、10	ゲッター水和剤	収穫7日前まで	3回以内	農業総使用回数、合わせて3回以内 1,500倍(100~3000)	67g	灰色かび病	○	○	水和剤	散布	ジエトフェンカルブ、チオファネートメチル	
		1	トップジンM水和剤	収穫前日まで	3回以内		1,500倍(100~3000)	67g	うどんこ病	○	○	水和剤	散布	チオファネートメチル
		M5	ダコニール1000	収穫前日まで	3回以内	1,000倍(100~3000)	100ml	うどんこ病	○	×	フロアブル	散布	TPN	
		3、U6	パンチョTF顆粒水和剤	収穫前日まで	2回以内	4,000倍(100~3000)	25g	うどんこ病	○	○	顆粒水和剤	散布	シルフィナド、トリフルメゾール	うどんこ病効果高
		7	アフェットフロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~3000)	50ml	うどんこ病	○	×	フロアブル	散布	ベンチオヒラト	
		11	アミスター20フロアブル	収穫前日まで	4回以内	2,000倍(100~3000)	50ml	うどんこ病	○	○	フロアブル	散布	アゾキシストロピン	展着剤不要
		M1	サンヨール	収穫前日まで	4回以内	500倍(100~3000)	200ml	うどんこ病	○	×	乳剤	散布	DBEDC	作物果実汚れが少ない
		M1	ヨネボン(乳剤)	収穫前日まで	4回以内	500倍(100~3000)	200ml	べと病	○	×	乳剤	散布	ニルフェノールスルホン酸銅	剤型注意、水和剤は登録外
		21	ランマンフロアブル	収穫前日まで	4回以内	1,000倍(100~3000)	100ml	べと病	○	×	フロアブル	散布	シアゾファミド	
		31	スターナ水和剤	収穫前日まで	3回以内	1,000倍(100~3000)	100g	軟腐細菌病	○	×	水和剤	散布	オキシリニック酸	
		—	マスタピース水和剤	収穫前日まで	—	1,000~2,000倍(100~3000)	100~50g	軟腐細菌病	○	×	水和剤	散布	シュードモナス ロデシア	高温時使用注意

◆銅剤の使用について・・・散布後、果面に薬が付着しやすいので収穫期は注意して散布しましょう。

用途	毒劇	IRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	1000調整時薬量	適用病害虫	効果発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
殺虫剤		4	ベストガード粒剤	定植時	1回	1~2g/株	—	アザミウマ類	—	—	粒剤	植穴処理土壌混和	ニテンピラム	
		4	スタークル顆粒水溶剤	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100~3000)	50g	アブラムシ類	中	長	顆粒水溶剤	散布	ジノテフラン	
	劇	4	バリアード顆粒水和剤	収穫前日まで	3回以内	4,000倍(100~3000)	25g	アブラムシ類	中	長	顆粒水和剤	散布	チアクロプリド	
		3	アディオン乳剤	収穫7日前まで	3回以内	2,000~3,000倍(100~3000)	50~33ml	アブラムシ類・フキノメイガ	速	長	乳剤	散布	ペルメトリン	
		6	アフーム乳剤	収穫3日前まで	2回以内	2,000倍(100~3000)	50ml	オオタバコガ	速	短	乳剤	散布	エマメクテン安息香酸塩	
		5	スピノエース顆粒水和剤	収穫前日まで	2回以内	5,000~10,000倍(100~3000)	20~10g	アザミウマ類	速	短	顆粒水和剤	散布	スピノサド	
		9	チェス顆粒水和剤	収穫前日まで	2回以内	5,000倍(100~3000)	20g	アブラムシ類	遅	長	顆粒水和剤	散布	ピメトロジン	浸透移行性あり
		23	モベントフロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~3000)	50ml	コナジラミ類、アブラムシ類	遅	長	フロアブル	散布	スピロトラト	養蜂注意
		28	プレバソンフロアブル5	収穫前日まで	3回以内	1,000倍(100~3000)	100ml	ハモグリバエ類	速	長	フロアブル	散布	クロラントラニリプロール	
		29	ウララDF	収穫前日まで	2回以内	2,000~4,000倍(100~3000)	50~25g	アブラムシ類	遅	長	顆粒水和剤	散布	フロニカミド	浸透移行性あり

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
茎葉除草剤 (非選択性)		バスタ液剤	収穫前日まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)	300~500ml(100~1500)	2回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	ゲルホシネート	