

だいこん登録農薬適用表

登録内容は2021年10月1日現在

用途	毒劇	RACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時薬量	適用病害虫・雑草	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌消毒	劇	FRAC M3 IRAC 8	ガスタード微粒剤	播種21日前まで	1回	20～30kg	—	一年生雑草、萎黄病、根こぶ病、パーティシリウム黒点病	—	—	微粒剤	土壌混和	ダゾメット	
						10～20kg	—	ネグサレセンチュウ						

用途	毒劇	FRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
殺菌剤		4、11	ユニフォーム粒剤	は種前	1回	6～9kg	—	白さび病	○	×	粒剤	全面土壌混和	メタキシLM、アゾキシストロピン	
		11	アミスター20フロアブル	収穫14日前まで	3回以内	2,000倍(100～300ℓ)	50ml	白さび病、ワッカ症	○	○	フロアブル	散布	アゾキシストロピン	
		M5	ダコニール1000	収穫45日前まで	3回以内	1,000倍(100～300ℓ)	100ml	炭疽病、白さび病、白斑病、ワッカ症	○	×	フロアブル	散布	TPN	
		31	スターナ水和剤	収穫14日前まで	5回以内	1,000倍(100～300ℓ)	100g	軟腐病	○	○	水和剤	散布	オキシリニック酸	
		24、M1	カスミンボルドー	収穫14日前まで	3回以内	1,000倍(100～300ℓ)	100g	軟腐病、ワッカ症、黒斑細菌病	○	○	水和剤	散布	カスガマイシン、塩基性塩化銅	
		M1	ヨネポン水和剤	収穫7日前まで	4回以内	500倍(100～300ℓ)	200g	白さび病、軟腐病、黒斑細菌病	○	×	水和剤	散布	ノニルフェノールスルホン酸銅	
		M1	Zボルドー	—	—	500倍(100～300ℓ)	500g	白さび病	○	×	水和剤	散布	塩基性硫酸銅	

用途	毒劇	IRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時薬量	適用病害虫	効果発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考	
殺虫剤		1	ネマトリンエース粒剤	は種前	1回	15kg～25kg	—	ネグサレセンチュウ	—	—	粒剤	全面土壌混和	ホスチアゼート		
						15kg～20kg	—	ネコブセンチュウ							
		1	ダイアジノン粒剤5	は種時 生育期、但し収穫21日前まで	1回 1回	農業総使用回数、合せて2回以内	4～6kg 6kg	— —	コガネムシ類幼虫、タネバエ、ケラ、ネキリムシ類 キスジノミハムシ、ネキリムシ類	— —	— —	粒剤	全面土壌混和 又は作業土壌混和 株元土壌混和	ダイアジノン	
		劇	3A	フォース粒剤	は種時 収穫14日前まで	1回	4kg	—	タネバエ	—	—	粒剤	播溝土壌混和	テフルトリン	
	6～9kg						—	キスジノミハムシ	全面土壌混和						
	6kg						—		株元散布						
		3	トレボン乳剤	収穫21日前まで	3回以内	1,000～2,000倍(100～300ℓ)	100～50ml	アブラムシ類、コナガ、ヨトウムシ、アオムシ	速	中	乳剤	散布	エトフェンブロックス		
		4	アドマイヤー1粒剤	は種時	1回	3kg～6kg	—	アブラムシ類	—	—	粒剤	播溝土壌混和	イミダクロプリド		
		劇	4	モスピラン顆粒水溶剤	収穫14日前まで	1回	2,000～4,000倍(100～300ℓ)	50～25g	アブラムシ類、カブラハバチ	中	長	顆粒水溶剤	散布	アセタミプリド	
	2,000倍(100～300ℓ)						50g	コナガ、キスジノミハムシ、アオムシ、ダイコンサルハムシ							
			4	スタークル顆粒水溶剤	収穫7日前まで	2回以内	2,000～3,000倍(100～300ℓ) 1,000倍(100～300ℓ)	50～33g 100g	アブラムシ類 キスジノミハムシ	中	長	顆粒水溶剤	散布	ジノテフラン	
		4	アクタラ顆粒水溶剤	収穫7日前まで	2回以内	2,000倍(100～300ℓ)	50g	アブラムシ類	中	長	顆粒水溶剤	散布	チアメトキサム		
		4C	トランスフォームフロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100～300ℓ)	50ml	アブラムシ類	速	長	フロアブル	散布	スルホキサフロル		
		6	アフファーム乳剤	収穫7日前まで	3回以内	1,000～2,000倍(100～300ℓ)	100～50ml	アオムシ、コナガ	速	短	乳剤	散布	エマメクテン安息香酸塩		
		劇	13	コテツフロアブル	収穫14日前まで	2回以内	2,000倍(100～300ℓ)	50ml	アオムシ、コナガ、ダイコンサルハムシ	速	中	フロアブル	散布	クロルフェナビル	
	劇	14	バダシSG水溶剤	収穫7日前まで	3回以内	1,500倍(100～300ℓ)	67g	コナガ、アオムシ、アブラムシ類、カブラハバチ、キスジノミハムシ、ハモグリバエ類	遅	中	水溶剤	散布	カルタップ		
	15	カスケード乳剤	収穫14日前まで	3回以内	2,000～4,000倍(100～300ℓ)	50～25ml	アオムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ	遅	長	乳剤	散布	フルフェノクスロン			
	28	ブレバソソフロアブル5	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100～300ℓ)	50ml	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ、ハモグリバエ類	速	長	フロアブル	散布	クロラントラニリプロール			
	29	ウララDF	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100～300ℓ)	50g	アブラムシ類	遅	長	顆粒水溶剤	散布	フロニカミド			

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌処理 除草剤		ラッソー乳剤	播種直後(壤土～埴土)	150ml(100ℓ)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	アラクロール	
茎葉除草剤 (選択性)		ナブ乳剤	雑草生育期 イネ科3～5葉期 収穫14日前まで	150～200ml(100～150ℓ)	1回	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	乳剤	雑草茎葉散布	セトキシジム	
茎葉除草剤 (非選択性)		バスタ液剤	収穫45日前まで(雑草生育期播種前又は畦間処理)	300～500ml(100～150ℓ)	2回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グルホシネート	