

もりあざみ(山ごぼう)登録農薬適用表(殺菌・殺虫・除草)

登録内容は2021年10月1日現在

用途	毒劇	RAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時 薬量	適用病害虫・雑草	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌消毒	劇	FRAC M3 IRAC 8	ガスタード微粒剤	は種21日前まで	1回	30kg	—	黒あざ病、半身萎凋病、一年生雑草	—	—	微粒剤	本剤の所定量を均一に散布して土壌と混和する	ダゾメット	

用途	毒劇	FRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時 薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
殺菌剤		M5	ダコニール1000	収穫30日前まで	3回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100ml	ステムフィリウム葉枯症	○	×	フロアブル	散布	TPN	

用途	毒劇	IRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
殺虫剤		1	ダイアジノン粒剤5	は種時	1回	6kg	—	ネキリムシ類	—	—	粒剤	土壌表面散布	ダイアジノン	
		3	ガードベイトA	生育初期 (但し、収穫7日前まで)	3回以内	3kg	—	ネキリムシ類	—	—	粒剤	株元散布	ペルメリン	

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
茎葉除草剤 (非選択性)		パスタ液剤	収穫30日前まで (雑草生育期は種前または畦間処理)	300~500ml (100~150ℓ)	3回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グルホシネート	
茎葉除草剤 (選択性)		ナブ乳剤	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) (但し収穫7日前まで)	150~200ml (100~150ℓ)	1回	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	乳剤	雑草茎葉散布	セトキシジム	
土壌処理 除草剤		アグロマックス水和剤	は種後発芽前 (雑草発生前)	150~200g (100ℓ)	1回	一年生雑草(キク科、カヤツリガサ科を除く)	水和剤	全面土壌散布	プロピザミド	