

# レタス登録農薬適用表(1)(殺菌・除草)

登録内容は2021年10月1日現在

用途	毒劇	RACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時薬量	適用病害虫	効果発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌処理	劇	IRAC 8	クロールピクリン	—	1回	<圃場>1穴当り3mL	—	ビッグベイン病	—	—	くん蒸剤	土壌くん蒸	クロールピクリン	
						<床土・堆肥>1穴当り3~5mL <圃場>1穴当り2~3mL	—	ケラ、センチュウ類、ネキリムシ類、ハリガネムシ類 根腐病、一年生雑草						

用途	毒劇	FRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
殺菌剤		P2	オリゼメート粒剤	定植時	1回	6~9kg	—	斑点細菌病、腐敗病	—	—	粒剤	土壌混和	プロベナゾール	
		1	トップジンM水和剤	収穫45日前まで	1回	1,500倍 (1.5ℓ/m <sup>2</sup> )	—	ビッグベイン病	○	○	水和剤	灌注	チオファネートメチル	
	収穫7日前まで			2回以内	1,500~2,000倍 (100~300ℓ)	67~50g	灰色かび病、菌核病	散布						
					1,500倍 (100~300ℓ)	67g	すそ枯病							
	1	ベンレート水和剤	収穫14日前まで	4回以内	2,000~3,000倍 (100~300ℓ)	50~33g	灰色かび病、菌核病、すそ枯病	○	○	水和剤	散布	ベノミル		
	10、1	ゲッター水和剤	収穫7日前まで	2回以内	農業総使用回数、 合わせて5回以内	1,500倍 (100~300ℓ)	67g	灰色かび病、菌核病	○	○	水和剤	散布	ジエトフェンカルブ、 チオファネートメチル	
	10、2	スミブレンド水和剤	収穫7日前まで	5回以内	1,000~2,000倍 (150~300ℓ)	100~50g	灰色かび病、菌核病	○	○	水和剤	散布	ジエトフェンカルブ、 プロシモドン		
		M5	ダコニール1000	収穫42日前まで	2回以内	1,000倍 (1.5~3ℓ/1m <sup>2</sup> )	—	ビッグベイン病	○	×	フロアブル	土壌灌注	TPN	
	収穫14日前まで			3回以内	1,000倍 (100~300ℓ)	100ml	べと病、すそ枯病、灰色かび病	散布						
		11	アミスター20フロアブル	収穫30日前まで	2回以内	2,000倍 (3ℓ/m <sup>2</sup> )	—	ビッグベイン病	○	△	フロアブル	土壌灌注	アゾキシストロビン	
	収穫7日前まで			4回以内	2,000倍 (100~300ℓ)	50ml	灰色かび病、菌核病、べと病、すそ枯病	散布						
		M1	キノンドーフロアブル	収穫21日前まで	5回以内	800~1,000倍 (100~300ℓ)	125~100ml	軟腐病、腐敗病、斑点細菌病	○	×	フロアブル	散布	有機銅	
		24、M1	カスミンボルドー	収穫7日前まで	4回以内	1,000倍 (100~300ℓ)	100g	斑点細菌病、腐敗病	○	○	水和剤	散布	カスガマイシン、 塩基性塩化銅	
	31	スターナ水和剤	収穫7日前まで	2回以内	2,000倍 (100~300ℓ)	50g	軟腐病、腐敗病、斑点細菌病、白絹病	○	○	水和剤	散布	オキシリニック酸		
	7	アフエットフロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000倍 (100~300ℓ)	50ml	すそ枯病、灰色かび病、菌核病	○	×	フロアブル	散布	ベンチオピラド		
	7	パレード20フロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000~4,000倍 (100~300ℓ)	50~25ml	菌核病、すそ枯病、灰色かび病	○	○	フロアブル	散布	ピラジフルミド		

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌処理 除草剤		クレマート乳剤	定植前又は定植・マルチ前(雑草発生前)	200~400ml (100~150ℓ)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ブタミホス	
		ゴーゴーサン乳剤	定植前(雑草発生前)	200~400ml (70~150ℓ)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ベンディメタリン	
		アグロマックス水和剤	定植前、定植後雑草発生前 但し、定植14日後まで(春・秋播き) 播種覆土後雑草発生前 但し、は種14日後まで(秋播き)	200~300g (70~100ℓ)	1回	一年生雑草(キク科、カヤツリグサ科を除く)	水和剤	全面土壌散布	プロピザミド	
茎葉処理 除草剤 (非選択性)		バスタ液剤	収穫30日前まで(雑草生育期、定植前又は畦間処理)	300~500ml (100~150ℓ)	2回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グリホシネート	
	毒	ブリグロックSL	播種前又は植付前 畦間処理雑草生育期 但し、収穫3日前まで	600~1,000ml (100~150ℓ)	3回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	ジクワット・パラコート	

# レタス登録農薬適用表(2) (殺虫)

登録内容は2021年10月1日現在

用途	毒劇	IRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考	
殺虫剤		1	ダイアジノン粒剤5	播種時又は定植時	2回以内	4~6kg	—	ケラ、コガネムシ類幼虫、ネキリムシ類	—	—	粒剤	全面土壌混和又は 作条土壌混和	ダイアジノン		
						6kg	—	ネキリムシ類				土壌表面散布			
		3	ガードベイトA	生育初期	5回以内	3kg	—	ネキリムシ類	—	—	粒剤	株元散布	ベルメトリン		
		28、4	ジュリボフロアブル	育苗期後半~定植当日	1回	農業総使用回数、 合せて1回以内	200倍セル成型育苗トレイ1箱(約30×60cm使用土壌約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ	—	アブラムシ類、カラヤカ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ナモグリバエ、ヒメアザミウマ	速	長	フロアブル	灌注	クロラントラニプロール チアメキサム	
		28	ブレバソフフロアブル5	育苗期後半~定植当日	1回		100倍セル成型育苗トレイ1箱(約30×60cm使用土壌約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ	—	ハモグリバエ類、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、オオタバコガ、ヒメアザミウマ				灌注		
				収穫前日まで	3回以内	1,000~2,000倍(100~300ℓ)	100~50ml	ハモグリバエ類	速	長	フロアブル	散布	クロラントラニプロール		
						2,000倍(100~300ℓ)	50ml	ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、オオタバコガ							
		4	モスピラン粒剤	定植前日~定植当日	1回	0.5g/株	—	ナモグリバエ、オオタバコガ、ヨトウムシ	—	—	粒剤	株元散布	アセタミプリド		
						0.25~0.5g/株	—	アブラムシ類							
		4	ダントツ水溶剤	収穫前日まで	2回以内	2,000~4,000倍	50~25g	アブラムシ類	中	長	水溶剤	散布	クロチアニジン		
						2,000倍(100~300ℓ)	50g	ナモグリバエ、アザミウマ類							
		4	ベストガード水溶剤	収穫3日前まで	3回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50g	アブラムシ類	中	長	水溶剤	散布	ニテンピラム		
		5	スピノエース顆粒水和剤	定植前まで	1回	500~1000倍セル成型育苗トレイ1箱(30×60cm・使用土壌約3ℓ)当り500ml	—	ハモグリバエ類	速	短	顆粒水和剤	灌注			
				収穫3日前まで	3回以内	2,500~5,000倍(100~300ℓ)	40~20g	オオタバコガ				散布	スピノサド		
						5,000倍(100~300ℓ)	20g	ヨトウムシ							
		5	ディアナSC	収穫前日まで	2回以内	2,500~5,000倍(100~300ℓ)	40~20ml	ハモグリバエ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、アザミウマ類	速	短	フロアブル	散布	スピネトラム		
	劇	14	リーフガード顆粒水和剤	収穫7日前まで	2回以内	1,500倍(100~300ℓ)	67g	ナモグリバエ、アザミウマ類、アブラムシ類、ナメクジ類	速	中	顆粒水和剤	散布	チオンクラム		
		UN	ブレオフロアブル	収穫7日前まで	2回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100ml	ハスモンヨトウ、ナモグリバエ、オオタバコガ、アザミウマ類	中	長	フロアブル	散布	ピリダリル		
		6	アニキ乳剤	収穫3日前まで	3回以内	1,000~2,000倍(100~300ℓ)	100~50ml	オオタバコガ、ハスモンヨトウ	速	長	乳剤	散布	レピメクテン		
		6、15	アフームエクスセラ顆粒水和剤	収穫3日前まで	3回以内	1,000~1,500倍(100~300ℓ)	100~67g	オオタバコガ	速	長	顆粒水和剤	散布	エマメクテン安息香酸塩 ルフェスロン		
					1,000倍(100~300ℓ)	100g	ナモグリバエ								
	15	カスケード乳剤	収穫3日前まで	3回以内	4,000倍(100~300ℓ)	25ml	オオタバコガ、ハスモンヨトウ	遅	長	乳剤	散布	フルフェノクスロン			
劇	13	コテツフロアブル	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ナモグリバエ、ヨトウムシ	速	中	フロアブル	散布	クロルフェナビル			
	29	ウララDF	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50g	アブラムシ類	速	中	水和剤	散布	フロニカミド			