

うど登録農薬適用表

登録内容は2021年10月1日現在

用途	毒劇	RAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌 消毒	劇	IRAC 8	クロールピクリン	—	1回	<床土・堆肥>1穴当り3~5mL <圃場>1穴当り2~3mL	—	萎凋病、一年生雑草	—	—	くん蒸剤	土壌くん蒸	クロールピクリン	

用途	毒劇	FRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時 薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
殺菌剤		M5	ダコニール1000	根株養成期但し、収穫200日前まで	3回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100ml	黒斑病	○	×	フロアブル	散布	TPN	
		14	リゾレックス粉剤	根株養成期定植前	1回	3g/株	—	白絹病	○	×	粉剤	根株粉衣	トルクロホスメチル	
		M1	ドイツボルドーA	根株養成期	—	500倍(100~300ℓ)	200g	黒斑病	○	×	水和剤	散布	塩基性塩化銅	
		2	ロブラール水和剤	根株養成期但し、収穫50日前まで	3回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100g	黒斑病	○	△	水和剤	散布	イプロジオン	
伏せ込み時但し、収穫21日前まで	1回			1,000倍(6ℓ/m ²)	—	菌核病	土壌灌注							

用途	毒劇	IRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
殺虫剤		1	カルホス粉剤	成虫飛来初期~盛期	5回以内	6kg	—	センノミキリ	中	中	粉剤	散布	イソキサチオン	
		1	スミチオン乳剤	根株養成期但し、収穫150日前まで	4回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100ml	アブラムシ類、センノミキリ、ヨトウムシ ヒメシロコブゾウムシ、ウヰノメイガ	速	短	乳剤	散布	MEP	
	劇	13	コテツフロアブル	根株養成期但し、収穫75日前まで	2回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	シクラメンコリダニ	速	中	フロアブル	散布	クロルフェナビル	幼虫・成虫・殺卵効果○
		3	トレボンEW	根株養成期但し、収穫45日前まで	2回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100ml	アブラムシ類	速	中	乳剤	散布	エトフェンプロックス	

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌処理 除草剤		ゲザノンゴールド	定植後萌芽前 (雑草発生前)(根株養成期)	250ml(100ℓ)	1回	一年生雑草	水和剤	全面土壌散布	アトラジン、S-メトラクロール	
		クレマート乳剤	定植後萌芽前 (雑草発生前)(根株養成期)	200ml(100~150ℓ)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ブタミホス	
茎葉除草剤 (非選択性)	毒	プリグロックスL	畦間処理;雑草生育期(根株養成期) 但し、収穫75日前まで	600~1,000ml(100~150ℓ)	2回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	ジクワット・パラコート	