

# やまのいも(長芋)登録農薬適用表(殺菌・殺虫・除草)

登録内容は2021年10月1日現在

用途	毒劇	RACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	1000調整時薬量	適用病害虫・雑草	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌消毒	劇	IRAC 8	クロールピクリン	—	1回	<圃場>2~3m/1穴	—	褐色腐敗病、根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、一年生雑草	—	—	くん蒸剤	土壌くん蒸	クロールピクリン	
	劇	IRAC 8	ドロクロール	—	1回				<圃場>2~3m/1穴	—	褐色腐敗病、根腐病、センチュウ類、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、一年生雑草	—	—	くん蒸剤
	劇	FRAC M3 IRAC 8	ガスタード微粒剤	植付け21日前まで	1回	20~30kg	—	褐色腐敗病、根腐病、一年生雑草	—	—	微粒剤	土壌混和	ダゾメット	

用途	毒劇	FRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	1000調整時薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
殺菌剤		1、M3	ベンレートT水和剤20	植付け前	1回	100~200倍(10分)	—	青かび病、褐色腐敗病	○	○	水和剤	種いも浸漬	チウラム、ベノミル	
						20倍(2秒)	—	根腐病						
						種いも重量の0.3~0.5%	—	青かび病						
			M7	ベルコートフロアブル	植付け前 収穫7日前まで	5回以内 (種いもへの処理は1回)	200倍 1,000倍(100~300ℓ)	— 100ml	青かび病 炭疽病、葉渋病	○	△	フロアブル	10分間種いも浸漬	イミノクタジナルベシル酸塩
									散布					
			M5	ダコニール1000	収穫30日前まで	6回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100ml	炭疽病、葉渋病、つる枯病	○	×	フロアブル	散布	TPN
			11	ストロビーフロアブル	収穫7日前まで	3回以内	2,000~3,000倍(100~300ℓ)	50~33ml	葉渋病	○	○	フロアブル	散布	クレソキシムメチル
			11	アミスター20フロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	葉渋病、炭疽病	○	○	フロアブル	散布	アゾキシストロピン
			M1	キノドール水和剤40	収穫14日前まで	5回以内	600倍(100~300ℓ)	167g	葉渋病	○	×	水和剤	散布	有機銅
		M1	コサイド3000	—	—	2,000倍(100~300ℓ)	50g	葉渋病	○	×	水和剤	散布	水酸化第二銅	
		M1	Zボルドー	—	—	500倍(100~300ℓ)	200g	炭疽病、葉渋病	○	×	水和剤	散布	塩基性硫酸銅	

用途	毒劇	IRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	1000調整時薬量	適用病害虫	効果発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
殺虫剤		1	ネマトリンエース粒剤	植付時	1回	20kg	—	ネコブセンチュウ	—	—	粒剤	全面土壌混和	ホスチアゼート	
		4	アドマイヤー1粒剤	植付時	1回	4kg	—	コガネムシ類、アブラムシ類	中	長	粒剤	植溝土壌混和	イミダクロプリド	
	劇	4	モスピラン顆粒水溶剤	収穫7日前まで 「むかご」は収穫21日前まで	3回以内	4,000倍(100~300ℓ)	25g	アブラムシ類、アザミウマ類、ナガイモコガ	中	長	水溶剤	散布	アセタミプリド	
	劇	3A	フォース粒剤	植付時	1回	4kg	—	タネバエ	—	—	粒剤	植溝土壌混和	テフルリン	
						6kg	—	ネキリムシ類						
			3	ガードベイトA	生育初期	5回以内	3kg	—	ネキリムシ類	—	—	粒剤	株元散布	ベルメリン
			3	トレボン乳剤	収穫14日前まで	3回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100g	アブラムシ類、ヤマノイモコガ、ハスモンヨトウ	速	中	乳剤	散布	エトフェンブロックス
	劇		3	マブリック水和剤20	収穫7日前まで	2回以内	2,000~4,000倍(100~300ℓ)	50~25g	アブラムシ類、ヤマノイモコガ、ハスモンヨトウ	速	長	水和剤	散布	フルバリネート
			6	コロマイト乳剤	収穫7日前まで	2回以内	1,000倍(100~500ℓ)	100ml	ハダニ類	速	短	乳剤	散布	ミルベメクテン
			29	ウララDF	収穫7日前まで	2回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50g	アブラムシ類	遅	長	顆粒水和剤	散布	フロニカミド
	劇		13	コテツフロアブル	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	カンザワハダニ、ナガイモコガ	速	中	フロアブル	散布	クロールフェナビル
			25	ダニサラバフロアブル	収穫前日まで	2回以内	1,000倍(100~350ℓ)	100ml	ハダニ類	速	中	フロアブル	散布	シフルメトフェン
		28	ブレバソソフロアブル5	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	ハスモンヨトウ、ナガイモコガ	速	長	フロアブル	散布	クロラントラニリプロール	

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
茎葉除草剤 (非選択性)		バスタ液剤	収穫30日前まで (雑草生育期植付前又は畦間処理)	300~500ml(100~150ℓ)	3回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グルホシネート	
茎葉除草剤 (選択性)		ナブ乳剤	雑草生育期イネ科雑草3~5葉期、 但し収穫60日前まで	150~200ml(100~150ℓ)	1回	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	乳剤	雑草茎葉散布	セトキシジム	
			雑草生育期イネ科雑草6~8葉期、 但し収穫60日前まで	200ml(100~150ℓ)						
土壌処理 除草剤		クレマート乳剤	植付後萌芽前(雑草発生前)	200~400ml(100~150ℓ)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ブタミホス	
		ロロック	植付直後 生育期・但し収穫60日前まで (雑草発生前~発生揃期)	100~200g(70~150ℓ)	2回以内	一年生雑草	水和剤	全面土壌散布 畦間土壌散布	リニユロン	