水田除草剤適用表

区分	時期	剤型・種類	除草剤名	成分数	雑草イネ対応剤	処理時期	10a当たり使用量	使用回数	処理法	SU抵抗性雑草対策	田植え同時※	一年生雑草		多年生雑草								アオミドロ・表層はく離
												ノビエ	その他	マツバイ	ホタルイ	ミズガヤツリ	ウリカワ	オモダカ	クログワイ	セリ	ヒルムシロ	
移植水稲	初期	フロアブル	農将軍フロアブル	3	●	植代後～移植7日前まで 移植時　移植直後～ノビエ1.5葉期、但し移植後30日まで	500mℓ	1	湛水散布	○	○	◎	○	◎	○	−	−	−	−	−	−	○
		粒剤	ピラクロン1キロ粒剤	1			1kg	1	湛水散布	−	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	−	○	−
		フロアブル	ピラクロンフロアブル	1			500mℓ	1	湛水散布	−	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	−	○	−
		粒剤	かねつぐ1キロ粒剤	2	●	移植時　移植直後～ノビエ1.5葉期、但し移植後30日まで	1kg	1	湛水散布	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	○	−
	初中期一発	粒剤	トップガンR1キロ粒剤	4		移植時　移植直後～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	1kg	1	湛水散布	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
		フロアブル	トップガンRフロアブル	4		移植時　移植直後～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	500mℓ	1	湛水散布	○	−	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
		豆つぶ	トップガンR豆つぶ250	4		移植直後～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで	250g	1	湛水散布	○	−	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
		ジャンボ	トップガンRジャンボ	4		移植直後～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで	250g（10個）	1	小包装のまま投げ入れる	○	−	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
		粒剤	アピログロウMX1キロ粒剤	4	●	移植時　移植直後～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	1kg	1	湛水散布	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
		ジャンボ	アピログロウMXジャンボ	4	●	移植後3日～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	400g（10個）	1	小包装のまま投げ入れる	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
		粒剤	アッパレZ1キロ粒剤	3		移植時　移植直後～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	1kg	1	湛水散布	○	○	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○
		フロアブル	アッパレZフロアブル	3		移植後3日～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	500mℓ	1	湛水散布	○	−	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○
		ジャンボ	アッパレZジャンボ	3		移植後3日～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	400g（10個）	1	小包装のまま投げ入れる	○	−	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○
		粒剤	サラブレットKAI1キロ粒剤	3		移植時　移植直後～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで	1kg	1	湛水散布	○	○	◎	◎	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○
		フロアブル	サラブレットKAIフロアブル	3		移植時　移植直後～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで	500mℓ	1	湛水散布	○	○	◎	◎	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○
		粒剤	カイリキＺ1キロ粒剤	3	●	移植時　移植直後～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	1kg	1	湛水散布	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
		フロアブル	カイリキＺフロアブル	3	●	移植後3日～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	500mℓ	1	湛水散布	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
		ジャンボ	カイリキZジャンボ	3	●	移植後3日～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	300g（10個）	1	小包装のまま投げ入れる	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
		フロアブル	ボデーガードフロアブル	2	●	移植後5日～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	500mℓ	1	湛水散布	○	−	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	−
		豆つぶ	ガンガン豆つぶ250	2	●	移植後3日～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで	250g	1	小包装のまま投げ入れる	○	−	◎	○	◎	○	○	○	◎	○	○	○	○
	中期	粒剤	レブラス1キロ粒剤	4		移植後14日～ノビエ4葉期、但し収穫60日前まで	1kg	1	湛水散布	○	−	◎	○	◎	◎	○	○	◎	◎	○	○	○
		ジャンボ	レブラスジャンボ	4		移植後14日～ノビエ4葉期、但し収穫60日前まで	400g（10個）	1	湛水散布	○	−	◎	○	◎	◎	○	○	◎	◎	○	○	○
		粒剤	ザーベックスDX1キロ粒剤	4	●	移植後20日～30日、ノビエ3.5葉期まで	1kg	1	湛水散布	○	−	◎	○	◎	○	○	○	○	○	−	○	○
		粒剤	ザーベックスSM粒剤	3	●	移植後20日～ノビエ2葉期、但し移植後30日まで	3kg	1	湛水散布	○	−	◎	○	◎	○	○	○	○	○	−	○	○
		豆つぶ	ツイゲキ豆つぶ250	3		移植後20日～ノビエ4葉期、但し収穫75日前まで	250g（10個）	1	湛水散布	○	−	◎	○	◎	◎	○	○	◎	◎	−	○	○
		粒剤	ワイドショット1キロ粒剤	2		移植後15日～ノビエ4葉期、但し収穫45日前まで	1kg	1	湛水散布	○	−	◎	◎	○	◎	○	○	◎	◎	○	○	−
	中期以降	ヒエのみ	トドメMF1キロ粒剤	1		移植後14日～ノビエ5葉期、但し収穫50日前まで	1kg	3	湛水散布	−	−	◎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			トドメMF乳剤	1		移植後14日～ノビエ7葉期、但し収穫50日前まで	200mℓ	2	湛水散布	−	−	◎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○
			ヒエクリーン1キロ粒剤	1		移植後15日～ノビエ4葉期、但し収穫45日前まで	1kg	1	湛水散布	−	−	◎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			ヒエクリーン豆つぶ250	1		移植後15日～ノビエ4葉期、但し収穫45日前まで	250g	1	湛水散布	○	−	◎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			クリンチャーEW	1		移植後20日～ノビエ6葉期、但し収穫30日前まで（希釈水量25～100ℓ/10a）	100mℓ	2	湛水散布又は落水散布	○	−	◎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			クリンチャージャンボ	1		移植後7日～ノビエ4葉期、但し収穫30日前まで	1kg（20個）	2	小包装のまま投げ入れる	○	−	◎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
				1		移植後25日～ノビエ5葉期、但し収穫30日前まで	1.5kg（30個）	2		○	−	◎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		広葉雑草	バサグラン粒剤	1		移植後15日～55日、但し収穫60日前まで	3～4kg	1	落水散布又はごく浅く湛水散布	○	−	−	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	−	−	−
			バサグラン液剤	1		移植後15日～55日、但し収穫50日前まで（希釈水量70～100ℓ）	500～700mℓ	2	落水散布又はごく浅く湛水散布	○	−	−	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	−	−	−
		ヒエ・広葉	クリンチャーバスME液剤	2		移植後15日～ノビエ5葉期、但し収穫50日前まで（希釈水量70～100ℓ/10a）	1000mℓ	2	落水散布又はごく浅く湛水散布	○	−	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	−	−	−
			アレイルSC	2		移植後25日～ノビエ5葉期、収穫45日前・出穂始期15日前まで（希釈水量100ℓ/10a）	500mℓ	2	湛水散布又はごく浅く湛水散布	○	−	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	−	−	−
		その他	モゲトン粒剤	1		ウキクサ類、藻類発生始期～発生盛期、但し収穫45日前まで	2～3kg	3	湛水散布	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	◎	◎
			モゲトンジャンボ	1		ウキクサ類、アオミドロ藻類による表層はく離の発生時、但し収穫45日前まで	1kg（20個）	3	水田に投げ入れる	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	◎	◎

※田植え同時処理は田植同時散布機で施用が可能です。（粒剤に限る）
※有効雑草についてはR3県基準等を参考にし、JA上伊那が実施した農薬試験の結果を反映してあります。
※天候や水田条件、散布時期等により効果に差が出ます。

各剤ごとに使用回数の表示を入れました。その中でバサグラン液剤・クリンチャーバス液剤・アレイルSCは2回使用できるようになっていますが、ほかの剤の中に同じ成分を使ってあるものがありますので、それぞれ1回の使用でお願いします。

◎ 効果高い
○ 効果あり
− 対象外