

7.上伊那統一施肥基準（土壌、標高差があるので土壌検査の結果を基本とする）

品目	肥料	年間 施肥量	施肥時期					成分(kg)				備考
			11月	3月	5月	8月	9月	N	P	K	Mg	
りんご	フルーツパワー上伊那	2袋	2					4.0	1.2	0.6	2.0	※樹勢をみてフルーツパワー上伊那の施肥量を調整する。 ※石灰の不足の場合はサンライムを施用する。
	マグゴールド	1袋		1						9		
	硫安	1袋		1				4.2				
	パワーリン3号	1袋	1						6.0		0.6	
	サンライム	2袋	2									
	合計							8.2	7.2	0.6	11.6	
二十世紀	フルーツパワー上伊那	4袋	4					8.0	2.4	1.2	4.0	※微量元素の不足の場合は、BMマルチサポートまたは、マグマンBを施用する。 ※ほう素欠乏防止に、ほう砂を2年に1度10a当り2kg全面施用する。
	マグゴールド	1袋		1							9	
	追肥グリーン	1袋					1	5.8	0.6			
	パワーリン3号	1袋	1						6.0		0.6	
	サンライム	2袋	2									
	合計							13.8	9.0	1.2	13.6	
赤梨 (幸水・南水・豊水・洋なし他)	フルーツパワー上伊那	5袋	5					10.0	3.0	1.5	5.0	※マグゴールド・パワーリン3号サンライム・ほう砂に変えて畑の味方10a5袋を施用できる。
	マグゴールド	1袋		1							9	
	追肥グリーン	1袋					1	5.8	0.6			
	硫安	1袋		1				4.2				
	パワーリン3号	1袋	1						6.0		0.6	
	サンライム	2袋	2									
合計							20.0	9.6	1.5	14.6		
梅 [すもも] [ブルー]	フルーツパワー上伊那	2袋	2					4.0	1.2	0.6	2.0	※5月追肥グリーンは強樹勢園火山灰土壌では使用しない。 ※8月に鶏糞10袋を追加施用する。 ※幼木、強樹勢樹では8月の鶏糞は施用しない。
	パワーリン3号	1袋	1						6.0		0.6	
	マグゴールド	1袋		1							9	
	追肥グリーン	2袋			1		1	11.6	1.2			
	サンライム	2袋	2									
	合計							15.6	8.4	0.6	11.6	
桃	フルーツパワー上伊那	3袋	3					6.0	1.8	0.9	3.0	※弱樹勢園ではフルーツパワー上伊那を1袋増す。 ※砂壤土園は8月に鶏糞5袋を追加施用する。
	パワーリン3号	1袋					1		6.0		0.6	
	マグゴールド	1袋		1							9	
	サンライム	2袋	2									
	合計							6.0	7.8	0.9	12.6	
ぶどう	フルーツパワー上伊那	1袋	1					2.0	0.6	0.3	1.0	
	パワーリン3号	1袋					1		6.0		0.6	
	マグゴールド	1袋		1							9	
	サンライム	3袋	3									
	合計							2.0	6.6	0.3	10.6	
ベブリール	丸桑粒状固形特3	3袋		1		1	1	7.2	3.0	3.0		※有機質マルチは時期を問わず施用する。 ※土壌PHを4.0～4.5を目標にする。
	木材チップ等有機質マルチ	厚さ10～20cm										
	合計							7.2	3.0	3.0		
かりん マルメロ	フルーツパワー上伊那	4袋	4					8.0	2.4	1.2	4.0	
	鶏糞	15袋				15						
	合計							8.0	2.4	1.2	4.0	
栗	フルーツパワー上伊那	4袋	4					8.0	2.4	1.2	4.0	※酸性土壌を好む。
	パワーリン3号	1袋					1		6.0		0.6	
	追肥グリーン	1袋					1	5.8	0.6			
	合計							13.8	9.0	1.2	4.6	
柿	フルーツパワー上伊那	4袋	4					13.8	2.4	1.2	4.0	※生育期の追肥と収穫前の基肥施用を基本とする。
	パワーリン3号	1袋					1		6.0		0.6	
	マグゴールド	1袋		1							9	
	追肥グリーン	1袋					1	5.8	0.6			
	鶏糞	10袋				10						
	サンライム	3袋	3									
	合計							13.8	9.0	1.2	13.6	

※ほう素欠乏防止にほう砂を2年に一度10a当り2kg全面施用する。