

ごぼう登録農薬適用表

登録内容は2021年10月1日現在

用途	毒劇	RAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時 薬量	適用病害虫・雑草	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌消毒	劇	IRAC 8	クロールピクリン	—	1回	<圃場>2~3ml/穴 <床土・堆肥>1穴当り3~5ml	—	ハリガネムシ類、ネキリムシ類、ケラ、黒あざ病、センチュウ類、一年生雑草	—	—	くん蒸剤	土壌くん蒸	クロールピクリン	
	劇	FRAC M3 IRAC 8	ガスタード微粒剤	播種28日前まで	1回	20~30kg	—	萎凋病、黒あざ病、一年生雑草	—	—	微粒剤	土壌混和	ダゾメット	

用途	毒劇	FRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時 薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
殺菌剤		14	リゾレックス粉剤	播種前	1回	40kg	—	黒あざ病	○	×	粉剤	全面土壌混和	トルクロホスメチル	
		24、M1	カスミンボルドー	収穫14日前まで	3回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100g	黒斑細菌病	○	○	水和剤	散布	カスカマイシ、塩基性塩化銅	

用途	毒劇	IRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
殺虫剤		1	ネマトリンエース粒剤	播種前	1回	20kg	—	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	—	—	粒剤	播溝土壌混和	ホスチアゼート	
		1	ダイアジノン粒剤5	播種時	1回	4kg	—	ネキリムシ類	—	—	粒剤	全面土壌混和	ダイアジノン	
	劇	1	ランネット45DF	収穫7日前まで	2回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100g	アブラムシ類	遅	短	水和剤	散布	メソミル	
	劇	3A	フォース粒剤	播種時	1回	4kg	—	ネキリムシ類	—	—	粒剤	全面土壌混和	テフルトリン	
		3	ガードベイトA	播種時~生育初期	5回以内	3kg	—	ネキリムシ類	—	—	粒剤	株元散布	ペルメトリン	
	劇	3	アグロスリン乳剤	収穫14日前まで	5回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	アブラムシ類	早	長	乳剤	散布	シペルメトリン	
		4	アドマイヤー1粒剤	播種時 収穫7日前まで	1回 2回以内	4kg	—	アブラムシ類	—	—	粒剤	播溝土壌混和 株元散布	イミダクロプリド	

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用病害虫	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌処理 除草剤		クロロIPC	播種直後	200~500ml(70~100ℓ)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	IPC	
		アグロマックス水和剤	播種後発芽前(雑草発生前)	200~300g(100ℓ)	1回	一年生雑草(キ科、カツリクサ科を除く)	水和剤	全面土壌散布	プロピザミド	
茎葉除草剤 (選択性)		ナブ乳剤	雑草生育期イネ科雑草3~5葉期 (収穫30日前まで)	150~200ml(100~150ℓ)	1回	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	乳剤	雑草茎葉散布 又は全面散布	セトキシジム	
			雑草生育期イネ科雑草6~8葉期 (収穫30日前まで)	200ml(100ℓ)						