

ジュース用トマト登録農薬適用表(1) (殺菌・除草・展着)

契約先のカゴメ(株)の基準です。基準以外の農薬の使用は控えて下さい

登録内容は2021年10月1日現在

用途	毒劇	FRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時 薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考	
殺菌剤		M5	ダコニール1000	播種時又は活着後 但し、定植14日後まで 収穫前日まで	4回以内 (土壌注は2回まで)	農業総使用回数、 合わせて 6回以内	1,000倍 (3ℓ/1㎡)	—	苗立枯病(リゾクトニア菌)	○	×	フロアブル	土壌注	TPN	同成分剤の使用回数に注意
				1,000倍 (100~300ℓ)			100ml	疫病、葉かび病、輪紋病、うどんこ病、 灰色かび病、炭疽病、すすかび病	散布						
		11、M5	アミスターオプティフロアブル	収穫前日まで	4回以内	農業総使用回数、 合わせて4回 以内	1,000倍 (100~400ℓ)	100ml	疫病、葉かび病、炭疽病、灰色かび病、すすかび病、斑点病	○	×	フロアブル	散布	TPN、 アゾキシストロビン	同成分剤の使用回数に注意
		11	アミスター20フロアブル	収穫前日まで	4回以内		2,000倍 (100~300ℓ)	50ml	灰色かび病、葉かび病	○	×	フロアブル	散布	アゾキシストロビン	同成分剤の使用回数に注意
		M7	ベルコート水和剤	収穫前日まで	3回以内		3,000~6,000倍 (100~300ℓ)	33~17g	灰色かび病、葉かび病	○	×	水和剤	散布	イノクダジナルベンシル酸塩	
		1	トップジンM水和剤	収穫前日まで	5回以内	農業総使用回数、 合わせて5回 以内	1,500~2,000倍 (100~300ℓ)	67~50g	灰色かび病、菌核病、葉かび病	○	○	水和剤	散布	チオファネートメチル	
		1、10	ゲッター水和剤	収穫前日まで	5回以内		1,000~1,500倍 (100~300ℓ)	100~67g	灰色かび病、菌核病、葉かび病	○	○	水和剤	散布	ジエトフェカルブ、 チオファネートメチル	
		7	カンタスドライフロアブル	収穫前日まで	3回以内		1,000~1,500倍 (100~300ℓ)	100~67ml	灰色かび病、菌核病、葉かび病	○	△	水和剤	散布	ポスカリド	
		11	ファンダジスタ顆粒水和剤	収穫前日まで	3回以内		2,000~3,000倍 (100~300ℓ)	50~33g	灰色かび病、葉かび病、菌核病、 斑点病、すすかび病	○	○	顆粒水和剤	散布	ピリハシカルブ	
		11、27	ホライズンドライフロアブル	収穫前日まで	3回以内		1,500~2,500倍 (150~300ℓ)	67~40ml	疫病	○	○	顆粒水和剤	散布	シモキサニル、ファモキサトール	
				2,500倍 (150~300ℓ)	40ml	葉かび病									
		21	ランマンフロアブル	収穫前日まで	4回以内		1,000~1,500倍 (150~300ℓ)	100~67ml	疫病	○	○	フロアブル	散布	シアソファミド	
		40	レーバフロアブル	収穫前日まで	3回以内		1,500~2,000倍 (150~300ℓ)	67~50ml	疫病	○	×	フロアブル	散布	マンジプロパミド	
		24、M1	カスミンボルドー	収穫前日まで	5回以内		1,000倍 (100~300ℓ)	100g	疫病、葉かび病、輪紋病、斑点細菌病、 かいよう病、軟腐病	○	○	水和剤	散布	カスカマイシン、 塩基性塩化銅	
		M1	ICボルドー66D	—	—		50倍 (100~300ℓ)	2ℓ	疫病	○	×	フロアブル	散布	塩基性硫酸銅	
		M1	Zボルドー	—	—		400~600倍 (100~300ℓ)	250~167g	疫病、輪紋病	○	×	水和剤	散布	塩基性硫酸銅	
			500倍	200g	すすかび病										
	M1	ドイツボルドーA	—	—		500倍 (100~300ℓ)	200g	疫病、葉かび病、斑点病	○	×	水和剤	散布	塩基性塩化銅		
	—	石灰ボルドー液	—	—		4-4式ボルドー液	—	疫病、夏疫病	○	×		散布	生石灰		

※「アミスターオプティフロアブル」は展着剤と混用しない。(葉害の恐れがあるため)

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
雑草除草剤 (非選択性)		ナブ乳剤	雑草生育期イネ科雑草3~5葉期(収穫14日前まで)	150~200ml (100~150ℓ)	1回	一年生イネ科雑草(スズメカササギ等除く)	乳剤	雑草茎葉散布	セトキシジム	
		バスタ液剤	雑草生育期定植前又は畦間処理(収穫前日まで)	300~500ml (100~150ℓ)	3回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グルホシネート	

ジュース用トマト登録農薬適用表(1) (殺菌・除草・展着)

ジュース用トマト登録農薬適用表(2)(殺虫)

登録内容は2021年10月1日現在

用途	毒劇	IRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	1000調整時薬量	適用病害虫	効果発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
殺虫剤		1	ネマトリンエース粒剤	定植前	1回	15~20kg	—	ネコブセンチュウ	—	—	粒剤	全面 土壌混和	ホスチアゼート	
		4	ベストガード粒剤	育苗期	1回	1~2g/株	—	コナジラミ類、アブラムシ類	中	長	粒剤	株元処理	ニテンピラム	
		定植時		1~2g/株		—	アブラムシ類、コナジラミ類	植穴処理土壌混和						
		2g/株		—		マハモクグリ								
		4	ベストガード水溶剤	収穫前日まで	3回以内	1,000~2,000倍(100~3000ℓ)	100~50g	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類	中	長	水溶剤	散布	ニテンピラム	
	劇	4	モスピラン顆粒水溶剤	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50g	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類	中	長	顆粒水溶剤	散布	アゼタフリド	
		28	プレバソフフロアブル5	育苗後半~定植当日	1回	100倍(1株当り25ml) 又は200倍(1株当り50ml)	—	ハモグリハエ類、コナジラミ類	速	長	フロアブル	灌注	クロラントラニリプロール	
		収穫前日まで		3回以内	1,000~2,000倍(100~300ℓ)	100~50ml	ハモグリハエ類	散布						
		2,000倍(100~300ℓ)			50ml	オオタバコガ								
		28	フェニックス顆粒水和剤	収穫前日まで	2回以内	2,000~4,000倍(100~300ℓ)	50~25g	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	速	長	顆粒水和剤	散布	フルベンジアミド	
		21	ダニトロンフロアブル	収穫開始14日前まで	3回以内	1,000~2,000倍(150~300ℓ)	100~50ml	タバコナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)	中	中	フロアブル	散布	フェニピロシメト	
		1,000倍				100ml	トモサビダニ							
		20	マイトコネフロアブル	収穫前日まで	1回	1,000倍(100~300ℓ)	100ml	ハダニ類、トモサビダニ	中	中	フロアブル	散布	ピフェナゼート	
		UN、M10	モレスタン水和剤	収穫前日まで	5回以内	1,500~2,000倍(100~300ℓ)	67~50g	コナジラミ類、トモサビダニ	中	中	水和剤	散布	キネキサリン系	
		5	スピノエース顆粒水和剤	収穫前日まで	2回以内	5,000倍(100~300ℓ)	20g	オオタバコガ、ハモグリハエ類、アザミウマ類	速	短	顆粒水和剤	散布	スピノサド	
		6	アフアーム乳剤	収穫前日まで	5回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	オオタバコガ、トモサビダニ、コナジラミ類、ハモグリハエ類	速	短	乳剤	散布	エマメチン安息香酸塩	
		6	コロマイト乳剤	収穫前日まで	2回以内	1,500倍(100~300ℓ)	67ml	ハモグリハエ類、トモサビダニ、コナジラミ類	速	短	乳剤	散布	シルバメチン	
		6	アニキ乳剤	収穫前日まで	3回以内	1,000~2,000倍(100~300ℓ)	100ml	コナジラミ類	速	短	乳剤	散布	レピメクチン	
		2,000倍(100~300ℓ)				50ml	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ハモグリハエ類、トモサビダニ							
		11	エスマルクDF	発生初期(収穫前日まで)	—	1,000~2,000倍(100~300ℓ)	100~50g	アオムシ、コナガ	中	中	顆粒水和剤	散布	BT	
	1,000倍(100~300ℓ)	100g				オオタバコガ、ヨウムシ								
	11	トアローフロアブルCT	発生初期(収穫前日まで)	—	500~1,000倍	200~100ml	オオタバコガ	中	中	フロアブル	散布	BT		
	1,000~2,000倍				100~50ml	アオムシ、コナガ								
	11	チューンアップ顆粒水和剤	発生初期(収穫前日まで)	—	2,000~3,000倍(100~300ℓ)	50~33g	アオムシ、コナガ、オオタバコガ、ハイマダラノメイガ	中	中	顆粒水和剤	散布	BT		
	2,000倍(100~300ℓ)				50g	ヨウムシ								
	3,000倍(100~300ℓ)				33g	ウリノメイガ								