

にんにく登録農薬適用表

登録内容は2021年10月1日現在

用途	毒劇	FRACコード	薬剤	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分	備考
殺菌剤		1、M3	ベンレートT水和剤20	植付前	1回	種球重量の0.5~1%	—	黒腐菌核病		—	水和剤	種球粉衣(湿粉衣)	チウラム、ペノミル	
						種球重量の1%	—	イモグサレセンチュウ						
		2	スミレックス水和剤	植付前	1回	種球重量の0.4%	—	黒腐菌核病	—	—	水和剤	種球粉衣(湿粉衣)	プロシモン	
		3、M3	テーク水和剤	収穫7日前まで	3回以内	600~800倍(100~300ℓ)	167~125g	さび病、葉枯病、白斑葉枯病	○	△	水和剤	散布	シロカール、マンゼブ	
		3	トリフミン水和剤	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50g	葉枯病	○	○	水和剤	散布	トリフルミゾール	
		11	アミスター20フロアブル	収穫7日前まで	3回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	さび病、葉枯病	○	○	フロアブル	散布	アゾキシストロビン	
		11	ストロビーフロアブル	収穫7日前まで	3回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	さび病	○	○	フロアブル	散布	クレソキシムメチル	
		M5	ダコニール1000	収穫7日前まで	6回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100ml	黄斑病、葉枯病、白斑葉枯病、さび病	○	×	フロアブル	散布	TPN	
		25、41	アグリマイシン100	収穫7日前まで	3回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100g	春腐病	○	○	水和剤	散布	オキシテトラサイクリン、ストレプトマイシン	
		24、M1	カスミンボルドー	収穫7日前まで	5回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100g	春腐病	○	○	水和剤	散布	カスガマイシン、塩基性塩基銅	
		M1	コサイド3000	—	—	2,000倍(100~300ℓ)	50g	春腐病	○	×	顆粒水和剤	散布	水酸化第二銅	
		M1	Zボルドー	—	—	500倍(100~300ℓ)	200g	春腐病、さび病、白斑葉枯病	○	×	水和剤	散布	塩基性硫酸銅	
		M1	ICボルドー66D	—	—	50倍(100~300ℓ)	2ℓ	春腐病、白斑葉枯病	○	×	水和剤	散布	塩基性硫酸銅	
		M7、19	ポリペリン水和剤	収穫3日前まで	3回以内	1,000~1,500倍(100~300ℓ)	100~67g	葉枯病、黄斑病	○	○	水和剤	散布	イミノクタジン酢酸塩、ポリオキシン	
	M7	ベルコート水和剤	収穫3日前まで	3回以内	1,000~1,500倍(150~300ℓ)	100~67g	葉枯病	○	△	水和剤	散布	イミノクタジンアルベシル酸塩		

用途	毒劇	IRACコード	薬剤	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時薬量	適用病害虫	効果発現性	残効性	剤型	使用方法	成分	備考
殺虫剤		1	ネマトリンエース粒剤	植付前	1回	25kg	—	イモグサレセンチュウ	—	—	粒剤	全面土壌混和	ホスチアゼート	
	劇	1	ダイアジノン水和剤34	収穫14日前まで	3回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100g	ネギコガ	速	短	水和剤	散布	ダイアジノン	
	劇	21 FRAC 39	ハチハチ乳剤	収穫7日前まで	2回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100g	ネギコガ、アザミウマ類、アブラムシ類、チューリップサビダニ、さび病	遅	中	乳剤	散布	トルフェンピラド	
	劇	3	マブリック水和剤20	収穫3日前まで	2回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50g	アブラムシ類、ネギコガ	速	長	水和剤	散布	フルバリネート	
	劇	4	モスピラン顆粒水溶剤	収穫前日まで	2回以内	2,000~4,000倍(100~300ℓ)	50~25g	アザミウマ類、アブラムシ類、ネギコガ	中	長	顆粒水溶剤	散布	アセタミプリド	

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
茎葉除草剤(非選択性)		バスタ液剤	収穫前日まで(雑草生育期植付前又は畦間処理)	300~500ml(100~150ℓ)	2回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グルホシネート	
茎葉除草剤(選択性)		ナブ乳剤	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)(但し、収穫7日前まで)	150~200ml(100~150ℓ)	1回	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	乳剤	雑草茎葉散布	セトキシジム	
土壌処理除草剤		クレマート乳剤	植付後萌芽前(雑草発生前)	200~400ml(100~150ℓ)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ブタミホス	
		ゴーゴーサン乳剤	植付前(マルチ前)植付後雑草発生前(但し、収穫60日前まで)	300~500ml(70~150ℓ)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ペンディメタリン	
		ロロックス	植付前(マルチ前)(雑草発生前)植付後~萌芽前(雑草発生前)	100~150g(70~150ℓ)	1回	一年生雑草	水和剤	全面土壌散布	リニュロン	