

ばれいしょ登録農薬適用表（殺菌・殺虫・除草剤）

登録内容は2021年10月1日現在

用途	毒劇	FRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
殺菌剤		21	オラクル粉剤	植付時	1回	20kg	—	粉状 とうか病	○	×	粉剤	全面土壌混和	アミスルプロム	
		36	ネビジン粉剤	植付時	1回	60kg	—	とうか病、粉状とうか病	○	×	粉剤	全面土壌混和	フルスルファミド	
		29	フロンスайд水和剤	植付前	6回以内 (植え付け前の土壌混和1回まで、 浸漬1回まで、散布4回まで)	600g (100ℓ)	—	塊茎褐色輪紋病、粉状とうか病	○	×	水和剤	全面散布 土壌混和	フルアジナム	
	100倍					—	とうか病	種いも瞬間浸漬						
	1,000～2,000倍 (100～300ℓ)			100～50g		疫病、菌核病	散布							
	2,000倍 (100～300ℓ)			50g		夏疫病								
		2	ロブラール水和剤	植付前	4回以内 (但し、種いも散布は1回以内)	125倍 (3ℓ/種いも100kg)	—	黒あざ病	○	×	水和剤	種いも散布	イプロジオン	
	収穫前日まで			1,000倍		100g	菌核病、夏疫病	散布						
		21	ランマンフロアブル	収穫7日前まで	4回以内	1,000～2,000倍 (100～300ℓ)	100～50ml	疫病	○	×	フロアブル	散布	シアゾファミド	
		31	スターナ水和剤	収穫7日前まで	5回以内	1,000倍 (100～300ℓ)	100g	軟腐病	○	○	水和剤	散布	オキシリニック酸	
		24、M1	カスミンボルドー	収穫7日前まで	3回以内	500～800倍 (100～300ℓ)	200～125g	軟腐病	○	○	水和剤	散布	カスガマイシン、塩基性塩化銅	
						800倍 (100～300ℓ)	125g	疫病						
	M1	コサイド3000	植付前	—	100倍	—	とうか病	○	×	顆粒水和剤	種いも瞬間浸漬	水酸化第二銅		
			—	—	1,000倍 (100～300ℓ)	100g	疫病、軟腐病				散布			
	M1	ドイツボルドーA	—	—	400～800倍 (100～300ℓ)	250～125g	疫病	○	×	水和剤	散布	塩基性塩化銅		
	M1	ICボルドー66D	—	—	50倍 (100～300ℓ)	2ℓ	疫病	○	×	水和剤	散布	塩基性硫酸銅		

用途	毒劇	IRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時薬量	適用病害虫	効果発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
殺虫剤		1	ダイアジノン粒剤5	植付前	1回	4～6kg	—	ケラ、ネキリムシ類	—	—	粒剤	全面土壌混和 又は作条土壌混和	ダイアジノン	
		1	スミチオン乳剤	収穫3日前まで	6回以内	1,000倍 (100～300ℓ)	100ml	アブラムシ類、テントウムシダマシ類	速	短	乳剤	散布	MEP	
		劇	4	モスピラン顆粒水溶剤	収穫7日前まで	3回以内	2,000～4,000倍 (100～300ℓ)	50～25g	テントウムシダマシ類	中	長	顆粒水溶剤	散布	アセタミプリド
	2,000～6,000倍 (100～300ℓ)						50～17g	アブラムシ類						
	2,000倍 (100～300ℓ)						50g	ジャガイモガ						
		3	トレボン乳剤	収穫7日前まで	3回以内	1,000倍 (100～300ℓ)	100ml	アブラムシ類	速	中	乳剤	散布	エトフェンブロックス	
		29	ウララDF	収穫7日前まで	2回以内	2,000～4,000倍 (100～300ℓ)	50～25g	アブラムシ類	遅	長	顆粒水和剤	散布	フロニカミド	
		28	フェニックス顆粒水和剤	収穫前日まで	2回以内	2,000～4,000倍 (100～300ℓ)	50～25g	ハスモンヨトウ	速	長	顆粒水和剤	散布	フルベンジアミド	
	劇	21 FRAC 39	ハチハチ乳剤	収穫前日まで	2回以内	2,000倍 (100～300ℓ)	50ml	アブラムシ類、ナストビハムシ	遅	中	乳剤	散布	トルフェンピラド	

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌処理 除草剤		クレマート乳剤	植付後萌芽前(雑草発生前)	200～400ml (100～150ℓ)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ブタミホス	
茎葉除草剤 (非選択性)		バスタ液剤	雑草生育期植付前又は植付後萌芽直前	100～200ml (100～150ℓ)	1回	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グルホシネート	
			収穫21日前まで(畦間処理:雑草生育期)	300～500ml (100～150ℓ)	2回以内					
	毒	ブリグロックスL	萌芽直前畦間処理、雑草生育期 (但し、収穫前日まで)	400～600ml (100～150ℓ)	2回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	ジクワット・パラコート	
茎葉除草剤 (選択性)		ナブ乳剤	雑草生育期(イネ科雑草3～5葉期)(収穫前日まで)	150～200ml (100～150ℓ)	2回以内	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	乳剤	雑草茎葉散布	セトキシジム	
			雑草生育期(イネ科雑草6～8葉期)(収穫前日まで)	200ml (100ℓ)						