

ニンジン登録農薬適用表

登録内容は2021年10月1日現在

用途	劇毒	RAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時 薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌消毒	劇	IRAC 8	クロールピクリン	-	1回	<圃場>2~3ml/1穴 <床土・堆肥>3~5ml/1穴	-	こぶ病、しみ腐病、紋羽病、ハガネムシ類、ネキリムシ類、センチュウ類、ケラ、一年生雑草	-	-	くん蒸剤	土壌くん蒸	クロールピクリン	
	劇	FRAC M3 IRAC 8	ガスタード微粒剤	播種または定植21日前まで	1回	20~30kg	-	しみ腐病、ネコブセンチュウ、根腐病、萎凋病、一年生雑草	-	-	微粒剤	土壌混和	ダゾメット	
用途	劇毒	FRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時 薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
殺菌剤		2	ロブラール水和剤	播種前	1回	種子重量の0.5%	-	黒葉枯病	○	△	水和剤	種子粉衣	イプロジオン	
				収穫14日前まで	4回以内	1,000~1,500倍	100~67g	斑点病、黒葉枯病				散布		
		11	ストロビーフロアブル	収穫7日前まで	3回以内	2,000~3,000倍(100~300ℓ) 3,000倍(100~300ℓ)	50~33ml 33ml	黒葉枯病 斑点病	○	○	フロアブル	散布	クレソキシムメチル	
		19	ポリオキシンAL水和剤	収穫7日前まで	5回以内	500倍(100~300ℓ)	200g	黒葉枯病	○	○	水和剤	散布	ポリオキシン	
		31	スターナ水和剤	収穫7日前まで	3回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100g	軟腐病、斑点細菌病	○	○	水和剤	散布	オキシリニック酸	
		P7	アリエッティ水和剤	収穫7日前まで	3回以内	800倍(100~300ℓ)	125g	黒葉枯病	○	○	水和剤	散布	ホセチル	
		24、M1	カスミンボルドー	収穫14日前まで	2回以内	1,000倍(100~300ℓ)	100g	黒葉枯病、軟腐病、斑点細菌病	○	○	水和剤	散布	カスガマイシン、 塩基性塩化銅	
		M1	キノンドーフロアブル	収穫3日前まで	5回以内	600~800倍(100~300ℓ)	167~125ml	黒葉枯病	○	×	フロアブル	散布	有機銅	
		M1	クプロシールド	-	-	1,000倍(100~300ℓ)	100ml	黒葉枯病、斑点病	○	×	フロアブル	散布	塩基性硫酸銅	
	M1	コサイド3000	-	-	500~1,000倍(100~300ℓ)	200~100g	黒葉枯病	○	×	水和剤	散布	水酸化第二銅		
	M1	Zボルドー	-	-	500~800倍(100~300ℓ)	200~125g	黒葉枯病	○	×	水和剤	散布	塩基性硫酸銅		
用途	劇毒	IRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100ℓ調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
殺虫剤		1	ダイアジノン粒剤5	播種前	1回	6kg	-	ネキリムシ類	-	-	粒剤	全面土壌混和	ダイアジノン	
		1	ネマトリンエース粒剤	播種前	1回	15~20kg 20kg	-	ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ	-	-	粒剤	全面土壌混和	ホスチアゼート	
	劇	3A	フォース粒剤	播種前	1回	12kg 4kg~12kg	-	クロバネキノコバエ類	-	-	粒剤	全面土壌混和	テフルトリン	
			播種時	4kg		-	ネキリムシ類	作条土壌混和						
		3	ガードベイトA	生育初期、但し収穫7日前まで	5回以内	3kg	-	ネキリムシ類	速	長	粒剤	株元散布	ペルメリン	
		劇	3	アグロスリン乳剤	収穫7日前まで	2回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	ヨトウムシ	速	長	乳剤	散布	シベルメリン
用途	劇毒	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考				
土壌処理 除草剤		クロロIPC	播種直後(高温時除く)	300~600ml(70~100ℓ)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	IPC					
		ロロックス	播種直後 (雑草発生始期)にんじん3~5葉期 (雑草発生始期、収穫30日前まで)	100~200g(70~150ℓ) 100~150g(70~150ℓ)	2回以内 (播種直後1回、 生育期1回)	一年生雑草	水和剤	全面土壌散布	リニューロン					
		ゴーゴーサン乳剤	は種後出芽前(雑草発生前)	200~400ml(70~150ℓ)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ペンディメタリン					
茎葉除草剤 (選択性)		ナブ乳剤	雑草生育期イネ科雑草3葉期~5葉期 但し収穫14日前迄 雑草生育期イネ科雑草6葉期~8葉期 但し収穫14日前迄	150~200ml(100~150ℓ) 200ml(100~150ℓ)	1回	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	乳剤	雑草茎葉散布 又は全面散布	セトキシジム					
		ポルトフロアブル	雑草生育期(イネ科雑草の3~8葉期) 収穫45日前まで	200~300ml(100ℓ)	1回	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	フロアブル	雑草茎葉散布 又は全面散布	キサロホップエチル					
茎葉 除草剤 (非選択性)		バスタ液剤	収穫前日まで (雑草生育期、播種前又は畦間処理)	300~500ml(100~150ℓ)	3回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グルホシネート					
		ラウンドアップマックスロード	耕起前又は播種前まで (雑草生育期)	200~500ml (通常散布50~100リットル/10a、 少量散布25~50リットル/10a)	2回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グリホサートカリウム塩					