

* 曆採用欄の空欄は防除曆に記載のない薬剤

マルメロ登録農薬適用表（殺虫・殺菌）

（R3年11月現在）

用途	毒劇	薬剤名	曆採用	剤型	使用方法	JA採用倍率	倍率	使用時期	使用回数	対象病害虫	成分名
殺菌殺虫剤		石灰硫黄合剤	○	液剤	散布	10倍	7倍 7~10倍	発芽前	—	ハダニ類 越冬病害虫・カイガラムシ類	多硫化カルシウム

用途	毒劇	薬剤名	曆採用	剤型	使用方法	JA採用倍率	倍率	使用時期	使用回数	対象病害虫	成分名
殺菌剤		ICボルドー412	○	水和剤	散布	30倍	30倍	—	—	ごま色斑点病	銅
		ダニコール1000	○	フロアブル	散布	1000倍	1000倍	収穫30日前まで	4回	ごま色斑点病	TPN
		キノドー水和剤80	○	水和剤	散布	1200倍	1200倍 1200~2000倍	収穫14日前まで	4回	ごま色斑点病 黒点病	有機銅
		スコア顆粒水和剤	○	顆粒水和剤	散布	2000倍	2000倍	収穫7日前まで	3回	ごま色斑点病	ジフェノコナゾール
		トップジンM水和剤	○	水和剤	散布	1000倍	1000~1500倍	収穫前日まで	6回	腐らん病	チオファネートメチル

用途	毒劇	薬剤名	曆採用	剤型	使用方法	JA採用倍率	倍率	使用時期	使用回数	対象病害虫	成分名
殺虫剤		機械油乳剤 95	○	乳剤	散布	12倍	12~14倍	発芽前	—	カイガラムシ類	マシン油
		サイアノックス水和剤	○	水和剤	散布	1000倍	1000倍	収穫45日前まで	2回	アブラムシ類・シンクイムシ類	CYAP
		アディオフロアブル	○	フロアブル	散布	1500倍	1500倍	収穫14日前まで	2回	シンクイムシ類	ベルメトリン
		アカリタッチ乳剤		乳剤	散布		1000~2000倍	収穫前日まで	—	ハダニ類	プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル

※適用表に記載されている剤型は、商品上の剤型です。