

スイートコーン登録農薬適用表 (殺虫・殺菌・除草)

注: 雑穀類です。野菜類で登録のある農薬は使用できません。(雑穀類登録 別ページ)

登録内容は2022年9月1日現在

用途	毒類	IRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g圃面積 消費量	適用病害虫	効果 発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
殺虫剤		4A	クルーザーFS30	は種前	1回	乾燥種子1kg当り原液6ml	—	ハリガネムシ類、タネバエ	—	—	液剤	塗沫処理	チアマトキサム	
		4A	アクアラ顆粒水溶剤	収穫7日前まで	2回以内	3,000倍(100~3000)	33g	アブラムシ類	中	長	顆粒水溶剤	散布	チアマトキサム	
		4A	ダントツ水溶剤	収穫3日前まで	3回以内	2,000~4,000倍(100~3000)	50~25g	アブラムシ類、アカスジカスミカメ、ツマジロクサヨトウ	中	長	水溶剤	散布	クロチアニジン	
	劇	4A	モスピラン顆粒水溶剤	収穫前日まで	3回以内	2,000~4,000倍(100~3000)	50~25g	アブラムシ類	中	長	顆粒水溶剤	散布	アセタミプリド	
	3C	トランスフォームフロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~3000)	50ml	ムギクビレアブラムシ	速	長	フロアブル	散布	スルホキサフロロ		
		3A	ガードベイトA	生育初期	4回以内	3kg	—	ネキリムシ類	速	長	ベイト	株元散布	ベルトリン	
		1B	ダイアジノン粒剤5	出芽時 収穫14日前まで	1回 2回以内	6kg 4~6kg	—	ネキリムシ類 アワノメイガ	速	短	粒剤	土壌表面散布 散布	ダイアジノン	
		1A	テナボン粒剤5	雄穂抽出期~雌穂抽出期、 ただし収穫21日前まで 収穫21日前まで	2回以内	4~6kg 3~6kg	—	アワノメイガ ダイメイチュウ	中	中	粒剤	散布	NAC	
	劇	1B	エルサン乳剤	収穫14日前まで	4回以内	1,000倍(100~3000)	100ml	アワノメイガ	速	短	乳剤	散布	PAP	
		1B	スミチオン乳剤	収穫7日前まで	4回以内	1,000倍(100~3000)	100ml	アワノメイガ、カメムシ類	速	短	乳剤	散布	MEP	
	劇	14	バダソG水溶剤	収穫21日前まで	2回以内	1,000倍(100~3000)	100g	アワノメイガ	遅	中	水溶剤	散布	カルタップ	
	劇	2B	プリンスフロアブル	収穫14日前まで	2回以内	2,000倍(100~3000)	50ml	アワノメイガ、オオタバコガ	遅	長	フロアブル	散布	フィプロニル	
		15	カスケード乳剤	収穫7日前まで	2回以内	2,000~4,000倍(100~3000) 2,000倍(100~3000) 4,000倍(100~3000)	50~25ml 50ml 25ml	アワノメイガ ツマジロクサヨトウ オオタバコガ	遅	長	乳剤	散布	フルフェノクスロン	
		3A	トレボン乳剤	収穫7日前まで	4回以内	1,000倍(100~3000)	100ml	アワノメイガ、アワトウ	速	中	乳剤	散布	エトフェンブロックス	
	劇	3A	アグロスリン乳剤	収穫7日前まで	3回以内	1,000~2,000倍(100~3000) 1,000倍(100~3000)	100~50ml 100ml	アワノメイガ、アブラムシ類 アワトウ	速	長	乳剤	散布	シベルメトリン	
		6	アファーム乳剤	収穫3日前まで	2回以内	1,000~2,000倍(100~3000)	100~50ml	ヨトウムシ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ	速	短	乳剤	散布	エマクチン安息香酸塩	
		29	ウララDF	収穫3日前まで	2回以内	2,000~4,000倍(100~3000)	50~25g	アブラムシ類	遅	長	顆粒水和剤	散布	フロニカミド	
		9B	コルト顆粒水和剤	収穫前日まで	3回以内	4,000倍(100~3000)	25g	アブラムシ類	中	中	顆粒水和剤	散布	ピリフルキナゾン	
	劇	13	コテツフロアブル	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100~3000)	50ml	オオタバコガ、ハダニ類	速	中	フロアブル	散布	クロルフェナピル	
		18	マトリックフロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~3000)	50ml	アワノメイガ	遅	長	フロアブル	散布	クロマフェンジド	
		22B	アクセルフロアブル	収穫前日まで	3回以内	1,000~2,000倍(100~3000) 1,000倍(100~3000)	100~50ml 100ml	アワノメイガ ツマジロクサヨトウ	遅	長	フロアブル	散布	メタフルミゾン	
	28	ブレバソフロアブル5	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~3000)	50ml	アワノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ	速	長	フロアブル	散布	クロラントラニリプロール		
	28	フェニックス顆粒水和剤	収穫前日まで	2回以内	2,000~4,000倍(100~3000)	50~25g	アワノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ	速	長	顆粒水和剤	散布	フルベンジアミド		
	28	ベネビアOD	収穫前日まで	3回以内	4,000倍(100~3000) 2,000倍(100~3000)	25ml 50ml	アワノメイガ、オオタバコガ、ツマジロクサヨトウ ムギクビレアブラムシ	速	長	液体	散布	シアントラニリプロール		
	UN	ブレオフロアブル	収穫前日まで	2回以内	1,000倍(100~3000)	100ml	オオタバコガ	中	長	フロアブル	散布	ピリダリル		
	11A	ゼンターリ顆粒水和剤	発生初期但し、収穫前日まで	—	1,000倍(100~3000)	100g	オオタバコガ	中	短	顆粒水和剤	散布	BT		

用途	毒類	FRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g圃面積 消費量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
その他		M3	キヒゲンR-2フロアブル	播種前	1回	乾燥種子1kg当たり 原液20ml	—	カラス、ハト、キジ、ムクドリ、スズメ、キジバト	—	—	フロアブル	塗沫処理	チウラム	
殺菌剤		3	トリフミン水和剤	収穫7日前まで	3回以内	2,000~4,000倍(100~3000)	50~25g	すす紋病	○	○	水和剤	散布	トリフルミゾール	
		U18	バリダシン液剤5	収穫7日前まで	3回以内	1,000倍(100~3000)	100ml	紋枯病	○	○	液剤	散布	バリダマイシン	

用途	毒類	薬剤名	使用時期	使用回数	10a当り使用量	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌処理 除草剤		フィールドスターP乳剤	播種後発芽前(雑草発生前)	1回	75~120ml(70~1500)	一年生雑草(アカザ科、アブラナ科、タデ科雑草を除く)	乳剤	全面土壌散布	ジメテナミドP	
		ロロックス	播種直後	1回	100~200g(70~1500)	一年生雑草	水和剤	全面土壌散布	リニユロン	マルチ栽培使用薬害注意
		クリアターナー乳剤	播種直後(雑草発生前)	1回	500~800ml(70~1000)	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ベンチオカブ、リニユロン ベンチダリジン	マルチ栽培使用薬害注意
		ゴーゴーサン乳剤	播種後発芽前(雑草発生前)	1回	200~400ml(70~1500)	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ベンディメタリン	マルチ栽培使用薬害注意
		ラッソー乳剤	播種後発芽前	1回	300~600ml(1000)	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	アラクロール	マルチ栽培使用薬害注意
雑草除草剤 (選択性)		バサグラン液剤	どうもろこしの生育期 雑草3~6葉期(収穫50日前まで)	1回	100~150ml(70~1000)	一年生雑草(イネ科を除く)	液剤	雑草茎葉散布 又は全面土壌散布	ベンタゾンナトリウム塩	
		ゲザンゴールド	マルチ前・播種前(雑草生育前)	1回	140~260ml(70~1500)	一年生雑草	水和剤	全面土壌散布	アトラジン、S-メトラクロール	マルチ栽培使用薬害注意
	播種後発芽前(雑草発生前)		140~260ml(70~1000)							
	生育期(どうもろこし 2~4葉期)									
	ブルーシアフロアブル	どうもろこしの生育期 雑草3~5葉期(収穫45日前まで) どうもろこしの生育期 雑草6~7葉期(収穫45日前まで)	1回	40~50ml(1000) 50~75ml(100~1500)	一年生雑草	フロアブル	雑草茎葉散布 又は全面土壌散布	トルピラレート		
雑草除草剤 (非選択性)	毒	ブリグロックスL	畝間処理:雑草生育期(草丈30cm以下)、 但し、収穫3日前まで	5回以内	600~1,000ml(100~1500)	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	ジクワット、パラコート	