

いちご登録農薬適用表(1) (殺虫)

野菜類登録の剤は別ページにまとめてあります。確認して使用してください。

登録内容は2022年9月1日現在

用途	毒劇	RAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100%調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌 消毒	劇	IRAC 8B	クロルピクリン錠剤	—	1回	1穴当たり1錠(30×30cm毎に1錠)	—	萎黄病、炭疽病、センチュウ類、疫病	—	—	錠剤	土壌くん蒸	クロルピクリン	
						1㎡当たり10錠	—	一年生雑草、萎黄病						

用途	毒劇	IRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100%調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考	
殺 虫 剤	—	—	エコビタ液剤	定植前	—	100倍	—	ハダニ類	中	短	液剤	苗浸漬 (10秒～1分)	還元澱粉糖化物		
				収穫前日まで		100倍(100～300ℓ)	1ℓ	アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、うどんこ病				散布			
	23	—	モベントフロアブル	育苗期後半～定植当日	1回	250倍(25ml/株)	—	アブラムシ類、ハダニ類	遅	長	フロアブル	灌注	スピロテトラマト	蜂、カブリダニ類(天敵)、 マルハナバチ 注意	
						500倍(25～50ml/株)	—	コナジラミ類、アブラムシ類							
						500倍(50ml/株)	—	アザミウマ類、ハダニ類							
	劇	4A	モスピラン顆粒水溶剤	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100～300ℓ)	50～25g	アブラムシ類、カキヒメコバエ、チハ [®] クロハネキノコバエ	中	長	顆粒 水溶剤	散布	アセタミプリド		
						2,000倍(100～300ℓ)	50g	コナジラミ類、アザミウマ類							
	4A	—	ベストガード水溶剤	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100～300ℓ)	50g	アブラムシ類、チハ [®] クロハネキノコバエ、コナジラミ類	中	長	水溶剤	散布	ニテンピラム		
	5	—	スピノエース顆粒水和剤	収穫前日まで	2回以内	5,000倍(100～300ℓ)	20g	アザミウマ類	速	短	顆粒 水和剤	散布	スピノサド		
	5	—	ディアナSC	収穫前日まで	2回以内	2,500～5,000倍(100～300ℓ)	40～20ml	アザミウマ類、ハスモンヨウ	速	短	フロアブル	散布	スピネトラム		
			2,500倍	コナジラミ類、クロハネキノコバエ類											
	9B	—	チェス顆粒水和剤	収穫前日まで	3回以内	5,000倍(100～300ℓ)	20g	コナジラミ類、アブラムシ類	中	中	顆粒 水和剤	散布	ピメロジン		
	9B	—	コルト顆粒水和剤	収穫前日まで	3回以内	3,000～4,000倍(100～300ℓ)	33～25g	コナジラミ類、アブラムシ類	中	中	顆粒 水和剤	散布	ピリフルキナゾン	養蜂注意	
	29	—	ウララDF	収穫前日まで	2回以内	2,000～4,000倍(100～300ℓ)	50～25g	アブラムシ類	遅	長	顆粒 水和剤	散布	フロニカミド		
						2,000倍(100～300ℓ)	50g	コナジラミ類							
	劇	13	—	コテツフロアブル	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100～300ℓ)	50ml	ハダニ類、ハスモンヨウ、シクラメホリダニ、ミンクイロアザミウマ	速	中	フロアブル	散布	クロルフェナビル	
	15	—	—	カスケード乳剤	収穫前日まで	3回以内	4,000倍(100～300ℓ)	25ml	ハスモンヨウ、アザミウマ類	遅	長	乳剤	散布	フルフェノクスロン	
	28	—	—	ベネビアOD	収穫前日まで	3回以内	2,000～4,000倍(100～300ℓ)	50～25ml	ハスモンヨウ	速	長	液剤	散布	シアントラニプロール	銅剤との混用注意
							2,000倍(100～300ℓ)	50ml	コナジラミ類、アザミウマ類、アブラムシ類						
	4C	—	—	トランスフォームフロアブル	収穫前日まで	3回以内	1,000～2,000倍(100～300ℓ)	100～50ml	コナジラミ類	速	長	フロアブル	散布	スルホキサフロル	
2,000倍(100～300ℓ)							50ml	アブラムシ類							
30	—	—	グレーション乳剤	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100～300ℓ)	50ml	アザミウマ類、ハスモンヨウ、ハダニ類、オオタバコガ	速	長	乳剤	散布	フルキサメタミド		
3A	—	—	アーデント水和剤	収穫前日まで	4回以内	1,000倍(150～300ℓ)	100g	アブラムシ類、ハダニ類、ミンクイロアザミウマ	速	中	水和剤	散布	アクリナトリン		
6	—	—	アフーム乳剤	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100～300ℓ)	50ml	オオタバコガ、ハスモンヨウ、ハダニ類、ヨトウムシ	速	短	乳剤	散布	エマメクテン安息香酸塩		
6	—	—	コロマイト水和剤	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100～300ℓ)	50g	ハダニ類、シクラメホリダニ	速	短	水和剤	散布	ミルベメクテン		
10A	—	—	ニソラン水和剤	収穫前日まで	2回以内	2,000～3,000倍(100～300ℓ)	50～33g	ハダニ類	遅	長	水和剤	散布	ヘキシチアゾクス		
劇	21A	—	ピラニカEW	収穫前日まで	2回以内	2,000～3,000倍(150～300ℓ)	50～33ml	ハダニ類	速	長	乳剤	散布	テブフェンピラド		
						2,000倍(150～300ℓ)	50ml	アブラムシ類、うどんこ病							
20D	—	—	マイトコーネフロアブル	収穫前日まで	2回以内	1,000倍(100～300ℓ)	100ml	ハダニ類	中	中	フロアブル	散布	ビフェナゼート		
25A	—	—	ダニサラバフロアブル	収穫前日まで	2回以内	1,000倍(100～350ℓ)	100ml	ハダニ類	速	中	フロアブル	散布	シフルメトフェン		
25A	—	—	スターマイトフロアブル	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100～300ℓ)	50ml	ハダニ類、シクラメホリダニ	速	長	フロアブル	散布	シエニピラフェン		

◆削除農薬(令和4年度中に使用下さい):「トルネードエースDF」「マブリック水和剤20」「テルスタージェット」「バロックフロアブル」