野沢菜登録農薬適用表

野菜類登録の剤は別ページにまとめてあります。確認して使用してください。

登録内容は2022年9月1日現在

用途	毒劇	RAC ⊐—ド	薬剤名	使用時期	使用回數	倍率・使用量(10a当り)	1000調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
土壤消毒	劇	IRAC 8	クロールピクリン	-	1回	<床土・堆肥>1穴当り3~5mL <圃 場>1穴当り2~3mL	-	萎黄病、ハリガネムシ類、ネキリムシ類、センチュウ類 ケラ、一年生雑草	-	-	くん蒸剤	土壌くん蒸	クロルピクリン	
用途	海廟	FRAC	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率·使用量(10a当り)	1000調整時 薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
殺菌剤		36	ネビリュウ	播種前	10	30kg	_	- 根こぶ病	0	×	粉粒剤	全面土壌混和	ーフルスルファミド	
						20kg	_					作条土壌混和		
		21	オラクル粉剤	播種前または定植前	2回以内	20~30kg	_	根こぶ病	0	×	粉剤	全面土壌混和	アミスルブロム	
		21	ランマンフロアブル	収穫3日前まで	3回以内	2,000倍(100~3000)	50ml	白さび病	0	Δ	フロアブル	散布	シアゾファミド	
		1	ベンレート水和剤	収穫21日前まで	1回	4,000倍(100~3000)	25g	炭疽病、白斑病	0	0	水和剤	散布	ベノミル	
		11	ストロビーフロアブル	収穫14日前まで	3回以内	3,000倍(100~3000)	33ml	べと病	0	0	フロアブル	散布	クレソキシムメチル	
		M1	ヨネポン水和剤	収穫7日前まで	4回以内	500倍(100~300ℓ)	200g	白さび病、軟腐病	0	×	水和剤	散布	ノニルフェノールスルホン酸銅	
用途	毒廟	IRAC ⊐—ド	薬剤名	使用時期	使用回數	倍率·使用量(10a当り)	1000調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
20-		1B	ダイアジノン粒剤5	播種時	1回	6kg	_	ケラ、キスジノミハムシ		-	粒剤	全面土壌混和	ダイアジノン	
				は種時又は定植時		ONS		ネキリムシ類						
	劇	ЗА	フォース粒剤	播種時	1回	4kg	_	ネキリムシ類、キスジノミハムシ	速	中	粒剤	全面土壌混和	テフルトリン	
		4A	アクタラ粒剤5	播種時	1回	6kg	_	アブラムシ類	中	長	粒剤	作条混和	チアメトキサム	
		4A	アクタラ顆粒水溶剤	収穫3日前まで	2回以内	2,000倍(100~3000)	50g	アブラムシ類	中	長	顆粒水溶剤	散布	チアメトキサム	
		4A	スタークル顆粒水溶剤	収穫3日前まで	2回以内	2,000倍(100~300ℓ)	50g	キスジノミハムシ	- ф	長	顆粒水溶剤	散布	ジノテフラン	
殺 虫 剤						3,000倍(100~3000)	33g	アブラムシ類						
剤	劇	13	コテツフロアブル	収穫14日前まで	1回	2,000倍(100~300ℓ)	50ml	コナガ	速	中	フロアブル	散布	クロルフェナビル	
		6	アファーム乳剤	収穫3日前まで	3回以内	1,000~2,000倍(100~300ℓ)	100~50ml	コナガ、アオムシ	速	短	乳剤	散布	エマメクチン安息香酸塩	
		6	アニキ乳剤	収穫前日まで	3回以内	1,000~2,000倍(100~300ℓ)	100∼50ml	キスジノミハムシ、コナガ、ハスミンヨトウ、ハモゲリバェ類	速	短	乳剤	散布	レピメクチン	
		28	プレバソンフロアブル5	収穫前日まで	2回以内	2,000倍 (100~300ℓ)	50ml	コナガ	速	長	フロアブル	散布	クロラントラニリプロール	
		29	ウララDF	収穫前日まで	2回以内	4,000倍(100~300ℓ)	25g	アブラムシ類	遅	長	顆粒水和剤	散布	フロニカミド	
		11A	トアローフロアブルCT	発生初期 但し,収穫前日まで	_	500倍(100~300ℓ)	200ml	ヨトウムシ	中	短	フロアブル	散布	вт	

◆銅剤の使用について・・・散布後、葉面に薬が付着しやすいので収穫期は注意して散布しましょう。

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌処理 除草剤		ラッソ一乳剤	播種直後	150ml (100l)	1回以内	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	アラクロール	
茎葉除草剤 (選択制)		ナブ乳剤	雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) 収穫7日前まで	150~200ml(100~150l)	1回以内	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	乳剤	雑草茎葉散布ま たは全面散布	セトキシジム	