

かぼちゃ登録農薬適用表

野菜類登録の剤は別ページにまとめてあります。確認して使用してください。

登録内容は2022年9月1日現在

薬剤名	毒劇	RAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時 薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	有効成分名	備考
土壌 消毒	劇	IRAC 8	クロールピクリン	—	1回	<圃場>3~4ml/穴	—	一年生雑草、フザリウム立枯病	—	—	くん蒸剤	土壌くん蒸 圃場:30X30cm以上の深さ15cmの穴に1穴処理する。	クロールピクリン	
	劇	FRAC M3 IRAC 8	ガスタード微粒剤	播種または定植21日前まで	1回	20~30kg	—	一年生雑草、苗立枯病(リゾニア菌)、フザリウム立枯病	—	—	微粒剤	土壌混和	ダゾメット	
殺菌 剤		3	トリフミン水和剤	播種前	1回	種子重量の0.3%	—	フザリウム立枯病	○	○	水和剤	種子粉衣(湿粉衣)	トリフルミゾール	同成分剤の使用回数に注意
				収穫前日まで	5回以内	3,000~5,000倍(100~300g)	33~20g	うどんこ病	○	○	水和剤	散布		
		3、U6	パンチョTF顆粒水和剤	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100~300g)	50g	うどんこ病	○	○	顆粒水和剤	散布	トリフルミゾール、シフルフェナド	同成分剤の使用回数に注意
		M1	キノンドー水和剤40	収穫7日前まで	3回以内	800~1,000倍(100~300g)	125~100g	べと病、炭疽病	○	×	水和剤	散布	有機銅	
		M1	サンヨール	収穫前日まで	4回以内	500倍(100~300g)	200ml	うどんこ病	○	×	乳剤	散布	DBEDC	
		M5	ダコニール1000	収穫7日前まで	3回以内	1,000倍(100~300g)	100ml	うどんこ病、べと病、白斑病	○	×	フロアブル	散布	TPN	
		M10	モレストン水和剤	収穫3日前まで	3回以内	2,000~4,000倍(100~300g)	50~25g	うどんこ病	○	△	水和剤	散布	キノキサリン系	
		1	トップジンM水和剤	収穫前日まで	5回以内	1,000倍(100~300g)	100g	白斑病	○	○	水和剤	散布	チオファネートメチル	
		7	アフェットフロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~300g)	50ml	うどんこ病、つる枯れ病	○	×	フロアブル	散布	ベンチオブラド	
		P7	アリエッティ水和剤	収穫前日まで	3回以内	400~800倍(100~300g)	250~125g	べと病、疫病	○	○	水和剤	散布	ホセチル	
		11	ストロビーフロアブル	収穫前日まで	3回以内	3,000倍(100~300g)	33ml	うどんこ病、べと病	○	○	フロアブル	散布	クレソキシムメチル	
		M2	サルファーゾル	—	—	500~1,000倍	200~100ml	うどんこ病	○	×	フロアブル	散布	水和硫黄	
	—		マスタピース水和剤	収穫前日まで	—	1,000~2,000倍(100~300g)	100~50g	軟腐細菌病	○	×	水和剤	散布	シュードモナス ロデシア	高温時使用注意

薬剤名	毒劇	IRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	残効性	剤型	使用方法	有効成分名	備考
殺虫 剤		1B	ダイアジノン粒剤5	播種時又は定植時	2回以内	4~6kg	—	ケラ、ネキリムシ類	速	短	粒剤	作付前:全面又は作業土壌混和作物生育中:作業処理し軽く覆土	ダイアジノン	
				収穫21日前まで	4回以内		—	コガネムシ類幼虫						
	劇	1B	ダイアジノン水和剤34	収穫21日前まで	4回以内	600倍(100~300g)	167g	キボシマルトビムシ	速	短	水和剤	散布	ダイアジノン	
						600~1,000倍(100~300g)	167~100g	ハダニ類						
						2,000倍(100~300g)	50g	アブラムシ類						
		1B	スミチオン乳剤	収穫14日前まで	3回以内	700~1,000倍(100~300g)	143~100ml	アザミウマ類	速	短	乳剤	散布	MEP	
						1,000~2,000倍(100~300g)	100~50ml	アブラムシ類						
		4A	アドマイヤー1粒剤	定植時	1回	2g/株	—	アザミウマ類、コナジラミ類	中	長	粒剤	植穴土壌混和	イミダクロブリド	
	劇	4A	モスピラン顆粒水溶剤	収穫前日まで	2回以内	2,000~4,000倍(100~300g)	50~25g	アブラムシ類、ウリハムシ	中	長	顆粒水溶剤	散布	アセタミプリド	
						2,000倍(100~300g)	50g	カボチャヤミバエ、ウリノメイガ						
劇	3A	マブリック水和剤20	収穫21日前まで	2回以内	4,000倍(100~300g)	25g	アブラムシ類	速	長	水和剤	散布	フルバリネート		
	29	ウララDF	収穫7日前まで	2回以内	2,000倍~4,000倍(100~300g)	50~25g	アブラムシ類	遅	長	顆粒水和剤	散布	フロニカミド	根汁吸着は速効的に阻止し、根死させるため見かけ上速効的	
劇	21A	サンマイトフロアブル	収穫3日前まで	2回以内	1,000~1,500倍(100~300g)	100~67ml	うどんこ病、コナジラミ類	速	長	フロアブル	散布	ピリダベン		
	28	フェニックス顆粒水和剤	収穫前日まで	2回以内	2,000~4,000倍(100~300g)	50~25g	ハスモンヨトウ	速	長	顆粒水和剤	散布	フルベンジアミド		

薬剤名	毒劇	薬剤名	使用時期	使用回数	10a当り使用量	適用雑草	剤型	使用方法	有効成分名	備考
土壌処理 除草剤		クレマート乳剤	定植・マルチ前(雑草発生前)	1回	200~400ml(100~150g)	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ブタミホス	
茎葉除草剤 (非選択性)		バスタ液剤	雑草生育期定植前又は畦間処理(収穫30日前まで)	2回以内	300~500ml(100~150g)	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グルホシネート	