

だいこん登録農薬適用表

野菜類登録の剤は別ページにまとめてあります。確認して使用してください。

登録内容は2022年9月1日現在

用途	毒劇	FRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時薬量	適用病害虫・雑草	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌消毒	劇	FRAC M3 IRAC 8F	ガスタード微粒剤	播種21日前まで	1回	20~30kg	—	一年生雑草、萎黄病、根こぶ病、バーティシリウム黒点病 ネグサレセンチュウ	—	—	微粒剤	土壌混和	ダゾメット	
						10~20kg	—							

用途	毒劇	FRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時薬量	適用病害虫・雑草	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考		
殺菌剤		4, 11	ユニフォーム粒剤	は種前	1回	6~9kg	—	白さび病	○	×	粒剤	全面土壌混和	メタラキシルM、アゾキシストロビン			
						6kg	—	白さび病				作業土壌混和				
			アミスター20フロアブル	収穫14日前まで	3回以内	2,000倍(100~300g)	50ml	白さび病、ワッカ症	○	○	フロアブル	散布	アゾキシストロビン	TPN		
			M5 ダコニール1000	収穫45日前まで	3回以内	1,000倍(100~300g)	100ml	炭疽病、白さび病、白斑病、ワッカ症	○	×	フロアブル	散布	オキシニコ酸	散布	オキシニコ酸	
			31 スターナ水和剤	収穫14日前まで	5回以内	1,000倍(100~300g)	100g	軟腐病	○	○	水和剤	散布	オキシニコ酸	散布	オキシニコ酸	
			24, M1 カスミンボルドー	収穫14日前まで	3回以内	1,000倍(100~300g)	100g	軟腐病、ワッカ症、黒斑細菌病	○	○	水和剤	散布	カスガマイシン、塩基性塩化銅	散布	カスガマイシン、塩基性塩化銅	
			M1 ヨネボン水和剤	収穫7日前まで	4回以内	500倍(100~300g)	200g	白さび病、軟腐病、黒斑細菌病	○	×	水和剤	散布	ノニルフェノールスルホン酸銅	散布	ノニルフェノールスルホン酸銅	
M1 Zボルドー	—	—	500倍(100~300g)	500g	白さび病	○	×	水和剤	散布	塩基性硫酸銅	散布	塩基性硫酸銅				

用途	毒劇	IRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時薬量	適用病害虫	効果発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考	
殺虫剤		1B	ネマトリンエース粒剤	は種前	1回	15kg~25kg	—	ネグサレセンチュウ	—	—	粒剤	全面土壌混和	ホスチアゼート		
						15kg~20kg	—	ネコブセンチュウ							
		1B	ダイアジノン粒剤5	は種時	1回	農業総使用回数、合わせて2回以内	4~6kg	—	コガネムシ類幼虫、タネバエ、ケラ、ネキリムシ類	—	—	粒剤	全面土壌混和 又は作業土壌混和	ダイアジノン	
				播種時または及び生育期、但し収穫21日前まで	1回		6kg	—	キスジ/ミハムシ				播種時・作業土壌混和 作物生育中・株元土壌混和		
				生育期 但し、収穫21日前まで	1回		6kg	—	ネキリムシ類				土壌表面散布		
	劇	3A	フォース粒剤	は種時	1回		4kg	—	タネバエ	—	—	粒剤	播溝土壌混和	テフルトリン	
				収穫14日前まで			4kg~9kg	—	キスジ/ミハムシ				全面土壌混和 播溝土壌混和		
		3A	トレボン乳剤	収穫21日前まで	3回以内	1,000~2,000倍(100~300g)	100~50ml	アブラムシ類、コナガ、ヨトウムシ、アオムシ	速	中	乳剤	散布	エトフェンブロックス		
		4A	アドマイヤー1粒剤	は種時	1回	3kg~6kg	—	アブラムシ類	—	—	粒剤	播溝土壌混和	イミダクロプリド		
	劇	4A	モスピラン顆粒水溶剤	収穫14日前まで	1回		2,000~4,000倍(100~300g)	50~25g	アブラムシ類、カブラハバチ	中	長	顆粒水溶剤	散布	アセタミプリド	
							2,000倍(100~300g)	50g	コナガ、キスジ/ミハムシ、アオムシ、ダイコンサルハムシ						
		4A	スタークル顆粒水溶剤	収穫7日前まで	2回以内		2,000~3,000倍(100~300g)	50~33g	アブラムシ類	中	長	顆粒水溶剤	散布	ジノテフラン	
							1,000倍(100~300g)	100g	キスジ/ミハムシ						
							2,000倍(100~300g)	50g	ダイコンハムシ						
		4A	アクタラ顆粒水溶剤	収穫7日前まで	2回以内	2,000倍(100~300g)	50g	アブラムシ類	中	長	顆粒水溶剤	散布	チアメキサム		
		4C	トランスフォームフロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~300g)	50ml	アブラムシ類	速	長	フロアブル	散布	スルホキサフル		
		6	アフーム乳剤	収穫7日前まで	3回以内		1,000~2,000倍(100~300g)	100~50ml	アオムシ、コナガ	速	短	乳剤	散布	エマメクテン安息香酸塩	
2,000倍(100~300g)							50g	ハイマダラノメイガ							
劇	13	コテツフロアブル	収穫14日前まで	2回以内	2,000倍(100~300g)	50ml	アオムシ、コナガ、ダイコンサルハムシ	速	中	フロアブル	散布	クロルフェナビル			
劇	14	バダシG水溶剤	収穫7日前まで	3回以内	1,500倍(100~300g)	67g	コナガ、アオムシ、アブラムシ類、カブラハバチ、キスジ/ミハムシ、ハモグリハエ類	遅	中	水溶剤	散布	カルタップ			
	15	カスケード乳剤	収穫14日前まで	3回以内	2,000~4,000倍(100~300g)	50~25ml	アオムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ	遅	長	乳剤	散布	フルフェクソロン			
	28	ブレバソフロアブル5	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~300g)	50ml	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ、ハモグリハエ類	速	長	フロアブル	散布	クロラントラニプロール			
	29	ウララDF	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100~300g)	50g	アブラムシ類	遅	長	顆粒水溶剤	散布	フロニカミド			

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌処理 除草剤		ラッソー乳剤	播種直後(壤土~埴土)	150ml(100g)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	アラクロール	
茎葉除草剤 (選択性)		ナブ乳剤	雑草生育期 イネ科3~5葉期 但し、収穫14日前まで	150~200ml(100~150g)	1回	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	乳剤	雑草茎葉散布	セトキシジム	
茎葉除草剤 (非選択性)		バスタ液剤	収穫45日前まで(雑草生育期播種前又は畦間処理)	300~500ml(100~150g)	2回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グルホシネート	