

はくさい登録農薬適用表(1) (殺菌・除草)

野菜類登録の剤は別ページにまとめてあります。確認して使用してください。

登録内容は2022年9月1日現在

用途	毒劇	FRAGコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考	
殺菌剤		P2	オリゼメート粒剤	は種又は定植前	1回	6~9kg	—	軟腐病	○	×	粒剤	全面 土壌混和	プロベナゾール		
		36	ネビリュウ	は種又は定植前 定植前	1回	20~30kg 20kg	— —	根こぶ病	○	×	粉粒剤	全面 土壌混和 作業 土壌混和	フルスファミド		
		21	オラクル粉剤	は種又は定植前 定植前	2回以内	30kg 20kg	— —	根こぶ病	○	×	粉剤	全面 土壌混和 作業 土壌混和	アミスルプロム		
		21	ランマンフロアブル	定植前日~当日 収穫14日前まで 収穫3日前まで	1回 1回 4回以内	6回以内 (育苗期灌注1 回以内、本圃灌 注1回以内、散 布4回以内)	500倍 セル成型育苗トレイ1箱(30× 60cm、使用土壌約2.5~7L)当り2L 2,000倍 (250ml/株) 2,000倍 (100~300L)	— — 50ml	根こぶ病 べと病、ビシウム腐敗病	○	△	フロアブル	灌注 散布	シアゾファミド	
		2	ロブラール水和剤	収穫14日前まで	3回以内	1,000~1,500倍 (100~300L) 1,000倍 (100~300L)	100~67g 100g	白斑病、黒斑病 菌核病	○	△	水和剤	散布	イプロジオン		
		40、M1	フェスティバルC水和剤	収穫14日前まで	3回以内	1,000倍 (100~300L)	100g	べと病	○	○	水和剤	散布	ジメモルフ・銅		
		M1	ヨネボン水和剤	結球開始まで (但し収穫14日前まで)	4回以内	500倍 (100~300L)	200g	軟腐病、べと病	○	×	水和剤	散布	ノルフェノールスルホン酸銅		
		1	トップジンM水和剤	収穫7日前まで	2回以内	1,500~2,000倍 (100~300L) 1,500倍(100~300L)	67~50g 67g	菌核病 白斑病、炭疽病	○	○	水和剤	散布	チオファネートメチル		
		11	アミスター20フロアブル	収穫7日前まで	4回以内	2,000~3,000倍 (100~300L) 2,000倍 (100~300L)	50~33ml 50ml	白斑病 べと病、黒斑病、白さび病	○	○	フロアブル	散布	アゾキシストロビン		
		11	ストロビーフロアブル	収穫3日前まで	3回以内	3,000倍 (100~300L)	33ml	黒斑病、白斑病、べと病	○	○	フロアブル	散布	クレソキシムメチル		
		M5	ダコニール1000	収穫7日前まで	2回以内	1,000倍 (100~300L)	100ml	黒斑病、白斑病、べと病、白さび病	○	×	フロアブル	散布	TPN		
		31	スターナ水和剤	収穫7日前まで	3回以内	1,000倍 (100~300L)	100g	黒斑細菌病、軟腐病	○	×	水和剤	散布	オキリニック酸		
		17	メジャーフロアブル	収穫3日前まで	3回以内	2,000倍 (100~300L)	50ml	黒斑病、白さび病、白斑病、べと病	○	○	フロアブル	散布	ピコキシストロビン		
		U18	バリダシン液剤5	収穫3日前まで	3回以内	500倍 (100~300L)	200ml	黒斑細菌病、軟腐病	○	○	液剤	散布	バリダマイシン		

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	使用回数	10a当り使用量	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌処理 除草剤		クレマート乳剤	定植前(雑草発生前)	1回	200ml (100~150L)	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ブタホス	
		ラッソー乳剤	播種直後	1回	150ml (100L)	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	アラクロール	
並葉処理 除草剤 (非選択性)		ラウンドアップマックスロード	耕起前又は定植5日前まで(雑草生育期)	1回	200~500ml(通常散布50~100L、少量散布25~50L)	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グリホサートカリウム塩	
	毒	ブリグロックSL	播種前又は植付前、 畦間処理:雑草生育期(収穫3日前まで)	3回以内	600~1,000ml (100~150L)	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	ジクワット・ハラコート	

はくさい登録農薬適用表(2) (殺虫)

登録内容は2022年9月1日現在

用途	毒劇	IRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時薬量	適用病害虫	効果発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考	
殺虫剤		4A	アドマイヤー1粒剤	定植時	1回	0.5g/株	—	アブラムシ類	—	—	粒剤	植穴土壌混和	イミダクロプリド		
		3A	ガードベイトA	は種時～生育初期	5回以内	3kg/10a	—	ネキリムシ類			粒剤	株元散布	ベルメトリン		
		劇	4A	モスピラン顆粒水溶剤	収穫14日前まで	3回以内	1,000～2,000倍(100～300g)	100～50g	アオムシ、コナガ	中	長	顆粒水溶剤	散布	アセタミプリド	
	2,000～4,000倍(100～300g)						50～25g	アブラムシ類							
	4,000倍(100～300g)						25g	カブラハバチ							
		28、4A	ジュリボフロアブル	育苗期後半～定植当日	1回	定植時まで1回以内、散布3回以内	200倍セル成型育苗トレイ1箱(約30×60cm使用土壌約1.5～4g)当り0.5g	—	アブラムシ類、コナガ、ヨウムシ、ハイマダラメイガ、ハスモンヨトウ、キスジ/ミハムシ/カブラハバチ	速	長	フロアブル	灌注	クロラントリプロール、チアオキサム	
	収穫3日前まで			3回以内	4,000倍(100～300g)		25ml	コナガ、ヨウムシ、ハイマダラメイガ、アブラムシ類、ハスモンヨトウ	散布						
		28	プレバソンフロアブル5	育苗期後半～定植当日	1回	定植時まで1回以内、散布3回以内	100倍セル成型育苗トレイ1箱(約30×60cm使用土壌約1.5～4g)当り0.5g	—	アオムシ、ハイマダラメイガ、ヨウムシ、コナガ、カブラハバチ	遅	長	フロアブル	灌注	クロラントリプロール	
	収穫前日まで			3回以内	2,000倍(100～300g)		50ml	アオムシ、コナガ、ヨウムシ、ハイマダラメイガ、ハスモンヨトウ、カブラハバチ	散布						
					20倍(1～2g)		50ml	アオムシ、コナガ、ヨウムシ、ハイマダラメイガ、ハスモンヨトウ、カブラハバチ	無人航空機による散布						
		28	フェニックス顆粒水和剤	収穫前日まで	3回以内	2,000～4,000倍(100～300g)	50～25g	アオムシ、オオタバコガ、コナガ、ハスモンヨトウ、ヨウムシ	速	長	顆粒水和剤	散布	フルベンシアミド	適用注意コナガ抵抗性表現	
		劇	21A	ハチハチフロアブル	収穫14日前まで	2回以内	1,000～2,000倍(100～300g)	100～50ml	アブラムシ類	遅	中	フロアブル	散布	トルフェンピラト	
	1,000倍(100～300g)						100ml	アオムシ、コナガ、ハイマダラメイガ、キスジ/ミハムシ、ダイコンサルハムシ、ナメクジ類							
		15	ノーモルト乳剤	収穫7日前まで	2回以内	2,000倍(100～300g)	50ml	アオムシ、コナガ、ヨウムシ、タナキシウワハ	遅	長	乳剤	散布	テラベンスロン		
		6、15	アフームエクセラ顆粒水和剤	収穫7日前まで	3回以内	1,000～1,500倍(100～300g)	100～67g	コナガ、オオタバコガ、ハスモンヨトウ、アオムシ	速	長	顆粒水和剤	散布	エマメチン安息香酸塩、ルフェエロン		
		6	アニキ乳剤	収穫3日前まで	3回以内	1,000～2,000倍(100～300g)	100～50ml	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラメイガ、オオタバコガ、カブラハバチ	速	中	乳剤	散布	レピメクチン		
	1,000倍(100～300g)					100ml	キスジ/ミハムシ								
		3A	トレボン乳剤	収穫7日前まで	3回以内	1,000～2,000倍(100～300g)	100～50ml	コナガ、ヨウムシ、アオムシ、アブラムシ類	速	中	乳剤	散布	エトフェンロックス		
		劇	14	バダンSG水溶剤	収穫7日前まで	3回以内	1,500倍(100～300g)	67g	アブラムシ類、コナガ、アオムシ、カブラハバチ	遅	中	水溶剤	散布	カルタップ	
		4C	トランスフォームフロアブル	収穫3日前まで	3回以内	2,000倍(100～300g)	50ml	アブラムシ類	速	長	フロアブル	散布	スルホキサフルル		
	5	スピノエース顆粒水和剤	収穫3日前まで	3回以内	2,500～5,000倍(100～300g)	40～20g	ハイマダラメイガ、アオムシ、コナガ	速	短	顆粒水和剤	散布	スピノサト			
5,000倍(100～300g)					20g	ヨウムシ、カブラハバチ									
	5	ディアナSC	収穫前日まで	2回以内	2,500～5,000倍(100～300g)	40～20ml	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ハイマダラメイガ、ヨウムシ、アザミウマ類、ウワハ類、オオタバコガ	速	短	フロアブル	散布	スピネトラム			
	劇	13	コテツフロアブル	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100～300g)	50ml	コナガ、ヨウムシ、アオムシ、カブラハバチ	速	中	フロアブル	散布	クロルフェナピル		
	29	ウララDF	収穫前日まで	2回以内	2,000～3,000倍(100～300g)	50～33g	アブラムシ類	速	中	水和剤	散布	フロニカシド			