

# さやえんどう登録農薬適用表

野菜類登録の剤は別ページにまとめてあります。確認して使用してください。

登録内容は2022年9月1日現在

用途	毒劇	FRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌消毒	劇	FRAC M3 IRAC 8	ガスタード微粒剤	播種又は定植21日前まで	1回	20~30kg	—	苗立枯病(リゾクトニア菌)、一年生雑草、茎腐病	—	—	微粒剤	土壌混和	ダゾメット	

用途	毒劇	FRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
殺菌剤		32	タチガレン液剤	播種後及び生育期(但し、播種後1~2ヶ月後まで)	3回以内	500~1,000倍 (3ℓ/㎡)	200~100ml	根腐病	—	—	液剤	は種穴又は株元に土壌灌中	ヒドロキシイソキサゾール	
		1	ベンレート水和剤	発芽14日後まで	2回以内	1,000倍 (3ℓ/㎡)	100g	立枯病	○	○	水和剤	灌注	ベンシル	
				収穫前日まで	3回以内	2,000倍 (100~300ℓ)	50g	菌核病				散布		
		3	トリフミン水和剤	収穫前日まで	5回以内	3,000~5,000倍 (100~300ℓ)	33~20g	うどんこ病	○	○	水和剤	散布	トリフルミゾール	
		3	サブロール乳剤	収穫前日まで	3回以内	1,500倍 (100~300ℓ)	67ml	うどんこ病	○	○	乳剤	散布	トリホリン	
		7	アフェットフロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000倍 (100~300ℓ)	50ml	灰色かび病、菌核病、さび病	○	×	フロアブル	散布	ベンチオピラト	豆類登録(未成熟)
		7, 11	シグナムWDG	収穫前日まで	2回以内	1,500~2,000倍 (100~300ℓ)	67~50g	さび病、灰色かび病、うどんこ病	○	○	顆粒水和剤	散布	ボスカリド、ピラクrostロピン	
		11	アミスター20フロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000倍 (100~300ℓ)	50ml	灰色かび病、菌核病、褐紋病	○	○	フロアブル	散布	アゾキシトロピン	
		M1	サンヨール	収穫前日まで	4回以内	500倍 (100~300ℓ)	200ml	うどんこ病、灰色かび病	×	○	乳剤	散布	DBEDC	
	M1	Zボルドー	—	—	1,000倍 (100~300ℓ)	100g	先端黄白化症	○	×	水和剤	散布	塩基性硫酸銅		

用途	毒劇	IRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時薬量	適用病害虫	効果発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
殺虫剤		1B	マラソン乳剤	収穫7日前まで	3回以内	2,000~3,000倍 (100~300ℓ)	50~33ml	アザミウマ類、アブラムシ類、ハダニ類、コガネムシ類	速	短	乳剤	散布	マラソン	豆類登録(未成熟)
	1,000倍 (100~300ℓ)					100ml	マメシキイガ、ハモグリバエ類、カメムシ類							
	2,000倍 (100~300ℓ)					50ml	インゲンテントウ							
		3A	トレボン乳剤	収穫前日まで	2回以内	1,000倍 (100~300ℓ)	100ml	ウラナミジミ、ヨウムシ、シロイモジヨトウ	速	中	乳剤	散布	エトフェンブロックス	
	劇	3A	マブリック水和剤20	収穫前日まで	3回以内	4,000倍 (100~300ℓ)	25g	ヒラズハナアザミウマ	速	長	水和剤	散布	フルバリネート	
	劇	3A	スカウトフロアブル	収穫前日まで	2回以内	1,500倍 (100~300ℓ)	67ml	ナモグリバエ	速	中	フロアブル	散布	トラロメトリン	
	劇	4A	モスピラン顆粒水溶剤	収穫前日まで	3回以内	4,000倍 (100~300ℓ)	25g	アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類	中	長	顆粒水溶剤	散布	アセタミプリド	
		4A	スタークル顆粒水溶剤	収穫前日まで	2回以内	2,000倍 (100~300ℓ)	50g	アブラムシ類、ハモグリバエ類、ウラナミジミ、カメムシ類	中	長	顆粒水溶剤	散布	ジノテフラン	
		5	ディアナSC	収穫前日まで	2回以内	2,500~5,000倍 (100~300ℓ)	40~20ml	ハモグリバエ類、ハスモンヨトウ、アザミウマ類	速	短	フロアブル	散布	スピネトラム	
		10A	ニツラン水和剤	収穫前日まで	2回以内	2,000~3,000倍 (100~300ℓ)	50~33g	ハダニ類	遅	長	水和剤	散布	ヘキシチアゾクス	
	劇	13	コテツフロアブル	収穫前日まで	2回以内	2,000倍 (100~300ℓ)	50ml	ハダニ類、ハスモンヨトウ	速	長	フロアブル	散布	クロルフェナビル	
	劇	14	パダシSG水溶剤	収穫前日まで	3回以内	1,500倍 (100~300ℓ)	67g	ウラナミジミ	遅	中	水溶剤	散布	カルタップ	
	1,500~3,000倍 (100~300ℓ)					67~33g	ナモグリバエ							
	2B	プレバソフロアブル5	収穫前日まで	3回以内	2,000倍 (100~300ℓ)	50ml	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類	速	長	フロアブル	散布	クロラントラニリプロール		
	UN	プレオフロアブル	収穫前日まで	2回以内	1,000倍 (100~300ℓ)	100ml	ハモグリバエ類、オオタバコガ	中	長	フロアブル	散布	ピリダリル	豆類登録(未成熟)	
1,000~2,000倍 (100~300ℓ)					100~50ml	ハスモンヨトウ								

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
茎葉除草剤(選択性)		バサグラン液剤	さやえんどうの3~6葉期(雑草の3~6葉期、但し収穫40日前まで)	100~200ml (70~100ℓ)	1回	一年生雑草(イネ科雑草を除く)	液剤	雑草茎葉散布	ペンタゾンナトリウム塩	
茎葉除草剤(非選択性)		バスタ液剤	播種前・定植前(雑草生育期) 収穫前日まで(畦間処理)(雑草生育期)	300~500ml (100~150ℓ)	3回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グルホシネート	