

レタス登録農薬適用表(1) (殺菌・除草)

野菜類登録の剤は別ページにまとめてあります。確認して使用してください。

登録内容は2022年9月1日現在

用途	毒劇	RAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	1000調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌処理	劇	IRAC 8	クロールピクリン	—	1回	<圃場>1穴当り3mL	—	ビッグベイン病	—	—	くん蒸剤	土壌くん蒸	クロールピクリン	
						<床土・堆肥>1穴当り3~5mL <圃場>1穴当り2~3mL	—	ケラ、センチュウ類、ネキリムシ類、ハリガネムシ類 根腐病、一年生雑草						

用途	毒劇	FRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	1000調整時 薬量	適用病害虫・雑草	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
殺菌剤		P2	オリゼメート粒剤	定植時	1回	6~9kg	—	斑点細菌病、腐敗病	—	—	粒剤	土壌混和	プロベナゾール	
		1	トップジンM水和剤	収穫45日前まで	1回	1,500倍 (1.5ℓ/m ²)	—	ビッグベイン病	○	○	水和剤	灌注	チオファネートメチル	
				収穫7日前まで	2回以内	1,500~2,000倍 (100~300ℓ) 1,500倍 (100~300ℓ)	67~50g 67g	灰色かび病、菌核病 すそ枯病				散布		
		1	ベンレート水和剤	収穫14日前まで	4回以内	2,000~3,000倍 (100~300ℓ)	50~33g	灰色かび病、菌核病、すそ枯病	○	○	水和剤	散布	ベノミル	
		10、1	ゲッター水和剤	収穫7日前まで	2回以内	1,500倍 (100~300ℓ)	67g	灰色かび病、菌核病	○	○	水和剤	散布	ジエトフェンカルブ、 チオファネートメチル	
		10、2	スミブレンド水和剤	収穫7日前まで	5回以内	1,000~2,000倍 (150~300ℓ)	100~50g	灰色かび病、菌核病	○	○	水和剤	散布	ジエトフェンカルブ、 プロシミドン	
		M5	ダコニール1000	収穫42日前まで	2回以内	1,000倍 (1.5~3ℓ/1m ²)	—	ビッグベイン病	○	×	フロアブル	土壌灌注	TPN	
				収穫14日前まで	3回以内	1,000倍 (100~300ℓ)	100ml	べと病、すそ枯病、灰色かび病				散布		
		11	アミスター20フロアブル	収穫30日前まで	2回以内	2,000倍 (3ℓ/m ²)	—	ビッグベイン病	○	△	フロアブル	土壌灌注	アゾキシストロピン	
				収穫7日前まで	4回以内	2,000倍 (100~300ℓ)	50ml	灰色かび病、菌核病、べと病、すそ枯病				散布		
		M1	キノンドーフロアブル	収穫21日前まで	5回以内	800~1,000倍 (100~300ℓ)	125~100ml	軟腐病、腐敗病、斑点細菌病	○	×	フロアブル	散布	有機銅	
		24、M1	カスミンボルドー	収穫7日前まで	4回以内	1,000倍 (100~300ℓ)	100g	斑点細菌病、腐敗病	○	○	水和剤	散布	カスガマイシン、 塩基性塩化銅	
		31	スターナ水和剤	収穫7日前まで	2回以内	2,000倍 (100~300ℓ)	50g	軟腐病、腐敗病、斑点細菌病	○	○	水和剤	散布	オキシソニック酸	
	7	アフェットフロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000倍 (100~300ℓ)	50ml	すそ枯病、灰色かび病、菌核病	○	×	フロアブル	散布	ベンチオピラド		
	7	パレード20フロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000~4,000倍 (100~300ℓ)	50~25ml	菌核病、すそ枯病、灰色かび病	○	○	フロアブル	散布	ピラジフルミド		

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌処理 除草剤		クレマート乳剤	定植前又は定植・マルチ前(雑草発生前)	200~400ml (100~150ℓ)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ブタミホス	
		ゴーゴーサン乳剤	定植前(雑草発生前)	200~400ml (70~150ℓ)	1回	一年生雑草	乳剤	全面土壌散布	ベンディメタリン	
		アグロマックス水和剤	定植前、定植後雑草発生前 但し、定植14日後まで(春・秋播き) 播種後土後雑草発生前 但し、は種14日後まで(秋播き)	200~300g (70~101ℓ)	1回	一年生雑草(キク科、カヤツリグサ科を除く)	水和剤	全面土壌散布	プロピザミド	
茎葉処理 除草剤 (非選択性)		バスタ液剤	収穫30日前まで(雑草生育期、定植前又は畦間処理)	300~500ml (100~150ℓ)	2回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グリホシネート	
	毒	ブリグロックスL	播種前又は植付前 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで	600~1,000ml (100~150ℓ)	3回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	ジクワット・バラコート	

レタス登録農薬適用表(2) (殺虫)

登録内容は2022年9月1日現在

用途	毒劇	IRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時薬量	適用病害虫	効果発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考	
殺虫剤		1B	ダイアジノン粒剤5	播種時又は定植時	2回以内	4~6kg	—	ケラ、コガネムシ類幼虫、ネキリムシ類	—	—	粒剤	全面土壌混和又は作条土壌混和 土壌表面散布	ダイアジノン		
		3A	ガードベイトA	生育初期	5回以内	3kg	—	ネキリムシ類	—	—	粒剤	株元散布	ベルメトリン		
		2B 4A	ジュリボフロアブル	育苗期後半~定植当日	1回	200倍セル成型育苗トレイ1箱(約30×60cm)使用土壌約1.5~4L)当り0.5L	—	アブラムシ類、カブラヤガ、ヨウムシ、ハスモンヨウ、オオタバコガ、ナモグリハエ、ヒメタテヨコバイ	速	長	フロアブル	灌注	クロラントラニプロール チアメトキサム		
		2B	ブレバソフロアブル5	育苗期後半~定植当日	1回		100倍セル成型育苗トレイ1箱(約30×60cm)使用土壌約1.5~4L)当り0.5L	—	ハモグリハエ類、ハスモンヨウ、ヨウムシ、オオタバコガ、ヒメタテヨコバイ、ネキリムシ類	速	長	フロアブル	灌注	クロラントラニプロール	
				収穫前日まで	3回以内	1,000~2,000倍(100~300L)	100~50ml	ハモグリハエ類	散布						
						2,000倍(100~300L)	50ml	ハスモンヨウ、ヨウムシ、オオタバコガ							
		4A	モスピラン粒剤	定植前日~定植当日	1回	0.5g/株	—	ナモグリハエ、オオタバコガ、ヨウムシ	—	—	粒剤	株元散布	アセタミプリド		
						0.25~0.5g/株	—	アブラムシ類							
		4A	ダントツ水溶剤	収穫3日前まで	2回以内	2,000~4,000倍	50~25g	アブラムシ類	中	長	水溶剤	散布	クロチアニジン		
						2,000倍(100~300L)	50g	ナモグリハエ、アザミウマ類							
		4A	ベストガード水溶剤	収穫3日前まで	3回以内	2,000倍(100~300L)	50g	アブラムシ類	中	長	水溶剤	散布	ニテンピラム		
			5	スピノエース顆粒水和剤	定植前日まで	1回	500~1000倍 セル成型育苗トレイ1箱(30×60cm)使用土壌約3L)当り500ml	—	ハモグリハエ類	速	短	顆粒水和剤	灌注	スピノサド	
				収穫3日前まで	3回以内	2,500~5,000倍(100~300L)	40~20g	オオタバコガ	散布						
						5,000倍(100~300L)	20g	ヨウムシ							
		5	ディアナSC	収穫前日まで	2回以内	2,500~5,000倍(100~300L)	40~20ml	ハモグリハエ類、オオタバコガ、ハスモンヨウ、アザミウマ類	速	短	フロアブル	散布	スピネトラム		
		劇	14	リーフガード顆粒水和剤	収穫7日前まで	2回以内	1,500倍(100~300L)	67g	ナモグリハエ、アザミウマ類、アブラムシ類、ナメクジ類	速	中	顆粒水和剤	散布	チオシクラム	
		UN		ブレオフロアブル	収穫7日前まで	2回以内	1,000倍(100~300L)	100ml	ハスモンヨウ、ナモグリハエ、オオタバコガ、アザミウマ類	中	長	フロアブル	散布	ピリダリル	
		6		アニキ乳剤	収穫3日前まで	3回以内	1,000~2,000倍(100~300L)	100~50ml	オオタバコガ、ハスモンヨウ	速	長	乳剤	散布	レビメクチン	
	6、15		アフームエクセラ顆粒水和剤	収穫3日前まで	3回以内	1,000~1,500倍(100~300L)	100~67g	オオタバコガ	速	長	顆粒水和剤	散布	エマメクチン安息香酸塩 ルフェヌロン		
					1,000倍(100~300L)	100g	ナモグリハエ								
	15		カスケード乳剤	収穫3日前まで	3回以内	4,000倍(100~300L)	25ml	オオタバコガ、ハスモンヨウ	遅	長	乳剤	散布	フルフェノクスロン		
	劇	13	コテツフロアブル	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100~300L)	50ml	オオタバコガ、ハスモンヨウ、ナモグリハエ、ヨウムシ	速	中	フロアブル	散布	クロルフェナピル		
		4C	トランスフォームフロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~300L)	50ml	アブラムシ類	速	長	フロアブル	散布	スルホキサフロル		
		29	ウララDF	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100~300L)	50g	アブラムシ類	速	中	水和剤	散布	フロニカミド		