

# 水田除草剤適用表

区分	時期	剤型・種類	除草剤名	成分数	雑草イネ対応剤	処理時期	10a当たり使用量	使用回数	処理法	SU抵抗性雑草対策	田植え同時※	一年生雑草										アオミドロ・表層はく離		
												ノビエ	その他	マツバイ	ホタルイ	ミズガヤツリ	ウリカワ	オモダカ	クロクワイ	セリ	ヒルムシロ			
移植水稲	初期	フロアブル	農将軍フロアブル	3	●	植代後～移植7日前まで 移植時 移植直後～ノビエ1.5葉期、但し移植後30日まで	500ml	1	湛水散布	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		粒剤	ピラクロン1 <sup>※</sup> 粒剤	1			1kg	1	湛水散布	-	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		フロアブル	ピラクロンフロアブル	1			500ml	1	湛水散布	-	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		粒剤	かねつぐ1 <sup>※</sup> 粒剤	2	●		移植時 移植直後～ノビエ1.5葉期、但し移植後30日まで	1kg	1	湛水散布	-	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	初中期一発	粒剤	トップガンR1キロ粒剤	4		移植時 移植直後～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	1kg	1	湛水散布	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		フロアブル	トップガンRフロアブル	4		移植時 移植直後～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	500ml	1	湛水散布	○	-	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		豆つぶ	トップガンR豆つぶ250	4		移植直後～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで	250g	1	湛水散布	○	-	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		ジャンボ	トップガンRジャンボ	4		移植直後～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで	250g(10個)	1	小包装のまま投げ入れる	○	-	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		粒剤	アピログロウMX1 <sup>※</sup> 粒剤	4	●	移植時 移植直後～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	1kg	1	湛水散布	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		ジャンボ	アピログロウMXジャンボ	4	●	移植後3日～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	400g(10個)	1	小包装のまま投げ入れる	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		粒剤	アツバレZ1 <sup>※</sup> 粒剤	3		移植時 移植直後～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	1kg	1	湛水散布	○	○	◎	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	
		フロアブル	アツバレZフロアブル	3		移植後3日～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	500ml	1	湛水散布	○	-	◎	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	
		ジャンボ	アツバレZジャンボ	3		移植後3日～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	400g(10個)	1	小包装のまま投げ入れる	○	-	◎	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	
		粒剤	サラレットKAI1 <sup>※</sup> 粒剤	3		移植時 移植直後～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで	1kg	1	湛水散布	○	○	◎	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	
		フロアブル	サラレットKAIフロアブル	3		移植時 移植直後～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで	500ml	1	湛水散布	○	○	◎	◎	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	
		粒剤	カイリキZ1 <sup>※</sup> 粒剤	3	●	移植時 移植直後～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	1kg	1	湛水散布	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		フロアブル	カイリキZフロアブル	3	●	移植後3日～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	500ml	1	湛水散布	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		ジャンボ	カイリキZジャンボ	3	●	移植後3日～ノビエ3葉期、但し移植後30日まで	300g(10個)	1	小包装のまま投げ入れる	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		豆つぶ	ガンガン豆つぶ250	2	●	移植後3日～ノビエ2.5葉期、但し移植後30日まで	250g	1	湛水散布	○	-	◎	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	
		中期	粒剤	レプラス1 <sup>※</sup> 粒剤	4		移植後14日～ノビエ4葉期、但し収穫60日前まで	1kg	1	湛水散布	○	-	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○
	ジャンボ		レプラスジャンボ	4		移植後14日～ノビエ4葉期、但し収穫60日前まで	400g(10個)	1	小包装のまま投げ入れる	○	-	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	
	粒剤		ザーベックスDX1 <sup>※</sup> 粒剤	4	●	移植後20日～30日、ノビエ3.5葉期まで	1kg	1	湛水散布	○	-	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	-	○	○	○	○	
	粒剤		ザーベックスSM粒剤	3	●	移植後20日～ノビエ2葉期、但し移植後30日まで	3kg	1	湛水散布	○	-	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	-	○	○	○	○	
	豆つぶ		ツイゲキ豆つぶ	3		移植後20日(稲5葉期以降)～ノビエ4葉期、但し収穫60日前まで	250g	1	湛水散布	○	-	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	-	○	○	○	○	
	中期以降	粒剤	ワイドショット1 <sup>※</sup> 粒剤	2		移植後15日～ノビエ4葉期、但し収穫45日前まで	1kg	1	湛水散布	○	-	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	-	○	○	○	○	
		ヒエのみ	トドメMF1 <sup>※</sup> 粒剤	1		移植後14日～ノビエ5葉期、但し収穫50日前まで	1kg	3	湛水散布	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			トドメMF乳剤	1		移植後14日～ノビエ7葉期、但し収穫50日前まで(希釈水量25～100ℓ/10a)	200ml	2	湛水散布	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
			ヒエクリーン1 <sup>※</sup> 粒剤	1		移植後15日～ノビエ4葉期、但し収穫45日前まで	1kg	1	湛水散布	-	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ヒエクリーン豆つぶ250	1		移植後15日～ノビエ4葉期、但し収穫45日前まで	250g	1	湛水散布	○	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			クリンチャーEW	1		移植後20日～ノビエ6葉期、但し収穫30日前まで(希釈水量25～100ℓ/10a)	100ml	2	湛水散布又は落水散布	○	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
広葉雑草		クリンチャージャンボ	1		移植後7日～ノビエ4葉期、但し収穫30日前まで	1kg(20個)	2	小包装のまま投げ入れる	○	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1		移植後25日～ノビエ5葉期、但し収穫30日前まで	1.5kg(30個)			○	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		パイスコープ1 <sup>※</sup> 粒剤	2		移植後14日～60日、但し収穫45日前まで	1kg	1	湛水散布	○	-	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	-		
		バサグラン粒剤	1		移植後15日～55日、但し収穫60日前まで	3～4kg	1	落水散布又は、ごく浅く湛水散布	○	-	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-		
ヒエ・広葉		バサグラン液剤	1		移植後15日～55日、但し収穫50日前まで(希釈水量70～100ℓ/10a)	500～700ml	2	落水散布又は、ごく浅く湛水散布	○	-	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-		
		クリンチャーバスメ液剤	2		移植後15日～ノビエ5葉期、但し収穫50日前まで(希釈水量70～100ℓ/10a)	1,000ml	2	落水散布又は、ごく浅く湛水散布	○	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-		
		アレイルSC	2		移植後25日～ノビエ5葉期、収穫45日前・出穂始期15日前まで(希釈水量100ℓ/10a)	500ml	2	ごく浅く湛水散布	○	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-		
		モゲトン粒剤	1		ウキクサ類、藻類発生始期～発生盛期、但し収穫45日前まで	2～3kg	3	湛水散布	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎		
モゲトンジャンボ	1		ウキクサ類、アオミドロ・藻類による表層はく離の発生時、但し収穫45日前まで	1kg(20個)	3	湛水散布、水田に投げ入れる	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◎	◎			

※田植え同時処理は田植同時散布機で施用が可能です。(粒剤に限る)

※有効雑草についてはR4県基準等を参考にし、JA上伊那が実施した農業試験の結果を反映してあります。

※天候や水田条件、散布時期等により効果に差が出ます。

各剤ごとに使用回数の表示を入れました。その中でバサグラン液剤・クリンチャーバスメ液剤・アレイルSCは2回使用できるようにしていますが、ほかの剤の中に同じ成分を使ってあるものがありますので、それぞれ1回の使用をお願いします。

◎ 効果高い

○ 効果あり

— 対象外