

にんじん登録農薬適用表

野菜類登録の剤は別ページにまとめてあります。確認して使用してください。

登録内容は2022年9月1日現在

| 用途 | 劇毒 | RAC コード | 薬剤名 | 使用時期 | 使用回数 | 倍率・使用量(10a当り) | 100%調整時 薬量 | 適用病害虫 | 予防 | 治療 | 剤型 | 使用方法 | 成分名 | 備考 |
|---------------------|----|-------------------|--|---|----------------------------|--|-----------------|--|-------------|-----|-------|------------------|--------------------|----|
| 土壌消毒 | 劇 | IRAC 8 | クローロピクリン | - | 1回 | <圃場>2~3ml/1穴 <床土・堆肥>3~5ml/1穴 | - | こぶ病、しみ腐病、紋羽病、ハリガムシ類、ネキリムシ類、センチュウ類、ケラ、一年生雑草 | - | - | くん蒸剤 | 土壌くん蒸 | クローロピクリン | |
| | 劇 | FRAC M3 IRAC 8 | ガスタード微粒剤 | 播種または定植21日前まで | 1回 | 20~30kg | - | しみ腐病、ネコブセンチュウ、根腐病、萎凋病、一年生雑草 | - | - | 微粒剤 | 土壌混和 | ダゾメット | |
| 用途 | 劇毒 | FRAC コード | 薬剤名 | 使用時期 | 使用回数 | 倍率・使用量(10a当り) | 100%調整時 薬量 | 適用病害虫 | 予防 | 治療 | 剤型 | 使用方法 | 成分名 | 備考 |
| 殺菌剤 | | 2 | ロブラール水和剤 | 播種前 収穫14日前まで | 1回 4回以内 | 種子重量の0.5% 1,000~1,500倍 | - 100~67g | 黒葉枯病 斑点病、黒葉枯病 | ○ | △ | 水和剤 | 種子粉衣 散布 | イプロジオン | |
| | | 11 | ストロビーフロアブル | 収穫7日前まで | 3回以内 | 2,000~3,000倍(100~300ℓ) 3,000倍(100~300ℓ) | 50~33ml 33ml | 黒葉枯病 斑点病 | ○ | ○ | フロアブル | 散布 | クレソキシムメチル | |
| | | 19 | ポリオキシAL水和剤 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 500倍(100~300ℓ) | 200g | 黒葉枯病 | ○ | ○ | 水和剤 | 散布 | ポリオキシ | |
| | | 31 | スターナ水和剤 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 1,000倍(100~300ℓ) | 100g | 軟腐病、斑点細菌病 | ○ | ○ | 水和剤 | 散布 | オキシソニック酸 | |
| | | P7 | アリエッティ水和剤 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 800倍(100~300ℓ) | 125g | 黒葉枯病 | ○ | ○ | 水和剤 | 散布 | ホセチル | |
| | | 24、M1 | カスミンボルドー | 収穫14日前まで | 2回以内 | 1,000倍(100~300ℓ) | 100g | 黒葉枯病、軟腐病、斑点細菌病 | ○ | ○ | 水和剤 | 散布 | カスガマイシン、 塩基性塩化銅 | |
| | | M1 | キノドーフロアブル | 収穫3日前まで | 5回以内 | 600~800倍(100~300ℓ) | 167~125ml | 黒葉枯病 | ○ | × | フロアブル | 散布 | 有機銅 | |
| | | M1 | クプロシールド | - | - | 1,000倍(100~300ℓ) | 100ml | 黒葉枯病 | ○ | × | フロアブル | 散布 | 塩基性硫酸銅 | |
| | | M1 | コサイド3000 | - | - | 500~1,000倍(100~300ℓ) | 200~100g | 黒葉枯病 | ○ | × | 水和剤 | 散布 | 水酸化第二銅 | |
| | | M1 | Zボルドー | - | - | 500~800倍(100~300ℓ) | 200~125g | 黒葉枯病 | ○ | × | 水和剤 | 散布 | 塩基性硫酸銅 | |
| 用途 | 劇毒 | IRAC コード | 薬剤名 | 使用時期 | 使用回数 | 倍率・使用量(10a当り) | 100%調整時 薬量 | 適用病害虫 | 効果 発現性 | 残効性 | 剤型 | 使用方法 | 成分名 | 備考 |
| 殺虫剤 | | 1B | ダイアジノン粒剤5 | 播種前 | 1回 | 6kg | - | ネキリムシ類 | - | - | 粒剤 | 全面土壌混和 | ダイアジノン | |
| | | 1B | ネマトリンエース粒剤 | 播種前 | 1回 | 15~20kg 20kg/10a | - - | ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ | - | - | 粒剤 | 全面土壌混和 | ホスチアゼート | |
| | 劇 | 3A | フォース粒剤 | 播種前 播種時 | 1回 | 12kg 4kg~12kg 4kg | - - - | クロバネキノコバエ類 ネキリムシ類 | - | - | 粒剤 | 全面土壌混和 作条土壌混和 | テフルトリン | |
| | | 3A | ガードベイトA | 生育初期、但し収穫7日前まで | 5回以内 | 3kg | - | ネキリムシ類 | 速 | 長 | 粒剤 | 株元散布 | ベルメトリン | |
| | 劇 | 3A | アグロスリン乳剤 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2,000倍(100~300ℓ) | 50ml | ヨトウムシ | 速 | 長 | 乳剤 | 散布 | シベルメトリン | |
| | 用途 | 劇毒 | 薬剤名 | 使用時期 | 10a当り使用量 | 使用回数 | 適用雑草 | 剤型 | 使用方法 | 成分名 | 備考 | | | |
| 土壌処理 除草剤 | | クロロIPC | 播種直後(高温時除く) | 500~600ml(70~100ℓ) | 1回 | 一年生雑草 | 乳剤 | 全面土壌散布 | IPC | | | | | |
| | | ロロックス | 播種直後 (雑草発生始期)にんじん3~5葉期 (雑草発生始期、収穫30日前まで) | 100~200g(70~150ℓ) 100~150g(70~150ℓ) | 2回以内 (播種直後1回、 生育期1回) | 一年生雑草 | 水和剤 | 全面土壌散布 | リニユロン | | | | | |
| | | ゴーゴーサン乳剤 | は種後出芽前(雑草発生前) | 200~400ml(70~150ℓ) | 1回 | 一年生雑草 | 乳剤 | 全面土壌散布 | ペンディメタリン | | | | | |
| 茎葉除草剤 (選択性) | | ナブ乳剤 | 雑草生育期イネ科雑草3葉期~5葉期 但し収穫14日前迄 雑草生育期イネ科雑草6葉期~8葉期 但し収穫14日前迄 | 150~200ml(100~150ℓ) 200ml(100~150ℓ) | 1回 | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 乳剤 | 雑草茎葉散布 | セトキシジム | | | | | |
| | | ポルトフロアブル | 雑草生育期(イネ科雑草の3~8葉期) 収穫45日前まで | 200~300ml(100ℓ) | 1回 | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | フロアブル | 雑草茎葉散布または 全面散布 | キザロホップエテル | | | | | |
| 茎葉 除草剤 (非選択性) | | バスタ液剤 | 収穫前日まで (雑草生育期、播種前又は畦間処理) | 300~500ml(100~150ℓ) | 3回以内 | 一年生雑草 | 液剤 | 雑草茎葉散布 | グルホシネート | | | | | |
| | | ラウンドアップマックスロード | 耕起前又は播種前まで (雑草生育期) | 200~500ml (通常散布50~100リットル/10a、 少量散布25~50リットル/10a) | 2回以内 | 一年生雑草 | 液剤 | 雑草茎葉散布 | グリホサートカリウム塩 | | | | | |