

なす登録農薬適用表(1) (殺菌・除草)

野菜類登録の剤は別ページにまとめてあります。確認して使用してください。

登録内容は2022年9月現在

用途	毒劇	IRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	持続性	剤型	使用方法	成分名	備考
殺 菌 剤		1	ベンレート水和剤	定植後～収穫14日前まで	3回以内	1,000倍(400～600ml/株)	—	半身萎凋病	○	○	水和剤	土壌灌注	ペノミル	
			500倍(200～300ml/株)	—										
			2,000～3,000倍(100～300ℓ)	50～33g		灰色かび病、黒枯病								
			2,000倍(100～300ℓ)	50g		菌核病、褐紋病								
		1	トップジンM水和剤	収穫前日まで	5回以内	1,500～2,000倍(100～300ℓ)	67～50g	灰色かび病、菌核病、黒枯病	○	○	水和剤	散布	チオファネートメチル	
		2	ロブラール水和剤	収穫前日まで	4回以内	1,000～1,500倍(100～300ℓ)	100～67g	灰色かび病、黒枯病	○	△	水和剤	散布	イプロジオン	
						1,000倍(100～300ℓ)	100g	すすかび病、菌核病、褐色斑点病						
		3	トリフミン水和剤	収穫前日まで	5回以内	3,000～5,000倍(100～300ℓ)	33～20g	うどんこ病	○	○	水和剤	散布	トリフルミゾール	
						3,000倍(100～300ℓ)	33g	すすかび病						
		9	フルピカフロアブル	収穫前日まで	4回以内	2,000～3,000倍(100～300ℓ)	50～33ml	うどんこ病、灰色かび病	○	△	フロアブル	散布	メバニピリム	
		11	アミスター20フロアブル	収穫前日まで	4回以内	2,000倍(100～300ℓ)	50ml	うどんこ病、すすかび病、褐色斑点病	○	○	フロアブル	散布	アゾキシストロビン	
		11	ストロビーフロアブル	収穫前日まで	3回以内	3,000倍(100～300ℓ)	33ml	うどんこ病、すすかび病	○	○	フロアブル	散布	クレソキシムメチル	
		M7	ベルコート水和剤	収穫前日まで	3回以内	3,000倍(100～300ℓ)	33g	うどんこ病、灰色かび病、すすかび病	○	△	水和剤	散布	イミノクタジナルベシル酸塩	同成分の使用回数に注意
		M7、17	ダイマジン	収穫前日まで	3回以内	1,500倍(150～300ℓ)	67g	すすかび病、灰色かび病	○	△	水和剤	散布	イミノクタジナルベシル酸塩、 フェンヘキサト	同成分の使用回数に注意
		21	ランマンフロアブル	収穫前日まで	4回以内	2,000倍(150～300ℓ)	50ml	褐色腐敗病	○	△	フロアブル	散布	シアゾファミド	
	M5	ダコニール1000	収穫前日まで	4回以内	1,000倍(100～300ℓ)	100ml	すすかび病、灰色かび病、黒枯病、うどんこ病	○	×	フロアブル	散布	TPN	同成分の使用回数に注意	
	M5、40	プロボーズ顆粒水和剤	収穫前日まで	4回以内	1,000倍(100～300ℓ)	100g	すすかび病、褐色腐敗病	○	○	顆粒水和剤	散布	TPN、 ペンチアバリカルブイソプロピル	同成分の使用回数に注意	
	M1	サンヨール	収穫前日まで	4回以内	700倍(100～300ℓ)	143ml	うどんこ病、すすかび病	○	×	乳剤	散布	DBEDC		
	7	バレード20フロアブル	収穫前日まで	3回以内	2,000～4,000倍(100～300ℓ)	50～25g	うどんこ病、菌核病、黒枯病、すすかび病、灰色かび病	○	○	フロアブル	散布	ピラジフルミド		

用途	毒劇	薬剤名	使用時期	使用回数	10a当り使用量	適用病害虫	剤型	使用方法	成分名	備考
茎葉除草剤 (非選択性)		バスタ液剤	収穫前日まで(雑草生育 期定植前又は畦間処理)	3回以内	300～500ml(100～150ℓ)	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グルホシネート	

なす登録農薬適用表(2) (殺虫)

登録内容は2022年9月現在

用途	毒劇	IRAC コード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時 薬量	適用病害虫	効果 発現性	持続性	剤型	使用方法	成分名	備考	
殺虫剤		1B	ネマトリンエース粒剤	定植前	1回	20kg 15~20kg	— —	オンシツコナジラミ、ハダニ類、ミナミキイロアザミウマ ネコブセンチュウ	遅	長	粒剤	全面土壌混和	ホスチアゼート		
		4A	アクトラ粒剤5	育苗期後半 定植時	1回	1g/株 1g/株 2g/株	— — —	アブラムシ類 アブラムシ類、コナジラミ類、マメハモグリバエ、 ミナミキイロアザミウマ、コガネムシ類幼虫 ミカンキイロアザミウマ	中	長	粒剤	株元散布 植穴処理	チアトキサム		
		2B	プリロツク粒剤オメガ	育苗期後半~定植時	1回	2g/株	—	ハモグリバエ類、アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類			粒剤	株元散布	シアントラニプロール		
		4A	アクトラ顆粒水溶剤	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(100~300g) 3,000倍(100~300g)	50g 33g	ミナミキイロアザミウマ、マメハモグリバエ、テントウムシダマシ類 アブラムシ類、コナジラミ類	中	長	顆粒水溶剤	散布	チアトキサム		
		4A	ダントツ水溶剤	収穫前日まで	3回以内	2,000~4,000倍(100~300g) 2,000倍(100~300g)	50~25g 50g	ミナミキイロアザミウマ、ハモグリバエ類、アブラムシ類、 コナジラミ類、テントウムシダマシ類、カメムシ類 カメムシ類	中	長	水溶剤	散布	クロチアニジン		
		4A	ベストガード水溶剤	収穫前日まで	3回以内	1,000~2,000倍(100~300g)	100~50g	アブラムシ類、ミナミキイロアザミウマ、コナジラミ類、カメムシ類	中	長	水溶剤	散布	ニテンピラム		
		4C	トランスフォームフロアブル	収穫前日まで	2回以内	1,000~2,000倍(100~300g) 2,000倍(100~300g)	100~50ml 50ml	コナジラミ類 アブラムシ類	速	長	フロアブル	散布	スルホキサフロル		
		23	モベントフロアブル	育苗期後半~定植当日 収穫前日まで	3回以内 (灌水は1回以内)	500倍(1株当り50ml) 500倍(1株当り25~50ml) 2,000倍(100~300g)	— — 50ml	アザミウマ類、チャノホコリダニ、ハダニ類、うどんこ病 アブラムシ類、コナジラミ類 アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類、 チャノホコリダニ、ハダニ類、うどんこ病	遅	長	フロアブル	灌注 散布	スピロテトラマト	養蜂注意	
		28	プレバソフフロアブル5	育苗期後半~定植当日 収穫前日まで	3回以内 (定植時1回以内、 散布2回以内)	100倍(1株当り25ml) 200倍(1株当り50ml) 1,000~2,000倍(100~300g) 2,000倍(100~300g)	— — 100ml 50ml	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、ネキリムシ類 ハモグリバエ類 ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ、オオタバコガ	速	長	フロアブル	灌注 散布	クロラントラニプロール		
		28	ヨーバルフロアブル	育苗期~定植当日 収穫前日まで	1回以内 3回以内	4回以内(灌 注は1回、散 布は3回以 内)	200倍(1株当り25ml) 2,500~5,000倍(100~300g)	— 40~20ml	アブラムシ類、コナジラミ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、オオタバコガ ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類、 アブラムシ類	速	長	フロアブル	灌注 散布	テトラニプロール	
		28	フェニックス顆粒水和剤	収穫前日まで	3回以内	2,000~4,000倍(100~300g) 4,000倍(100~300g)	50~25g 25g	ハスモンヨトウ、オオタバコガ アズキノメイガ	速	長	顆粒水和剤	散布	フルベンジアミド		
		5	ディアナSC	収穫前日まで	2回以内	2,500~5,000倍(100~300g) 2,500倍(100~300g)	40~20ml 40ml	アザミウマ類、ハモグリバエ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ コナジラミ類	速	短	フロアブル	散布	スピネトラム		
		5	スピノエース顆粒水和剤	収穫前日まで	2回以内	5,000倍(100~300g) 2,500~5,000倍(100~300g)	20g 40~20g	オオタバコガ アザミウマ類	速	短	顆粒水和剤	散布	スピノサド		
		6	アフーム乳剤	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100~300g)	50ml	ハダニ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類、 アザミウマ類、チャノホコリダニ、コナジラミ類	速	短	乳剤	散布	エマメクテン安息香酸塩		
		6	コロマト乳剤	収穫前日まで	2回以内	1,500倍(100~300g)	67ml	ハダニ類、ハモグリバエ類、コナジラミ類、チャノホコリダニ	速	短	乳剤	散布	ミルベメクテン		
	劇	13	コテツフロアブル	収穫前日まで	4回以内	2000倍(100~300g)	50ml	ヨウムシ、ハスモンヨトウ、ミカンキイロアザミウマ、ミナミキイロアザミウ マ、オオタバコガ、ハダニ類、チャノホコリダニ、テントウムシダマシ類	速	中	フロアブル	散布	クロルフェナビル		
		15	カスケード乳剤	収穫前日まで	4回以内	2,000~4,000倍(100~300g) 2,000倍(100~300g)	50~25ml 50ml	ミナミキイロアザミウマ、カメムシ類、オオタバコガ ハダニ類、マメハモグリバエ	遅	長	乳剤	散布	フルフェノクスロン		
		20D	マイトコーネフロアブル	収穫前日まで	1回	1,000倍(100~300g)	100ml	ハダニ類	中	中	フロアブル	散布	ピフェナゼート		
		25A	ダニサラフフロアブル	収穫前日まで	2回以内	1,000倍(100~350g)	100ml	ハダニ類	速	中	フロアブル	散布	シフルメトフェン		
		29	ウララDF	収穫前日まで	3回以内	2,000~4,000倍(100~300g) 2,000倍(100~300g)	50~25g 50g	アブラムシ類 コナジラミ類、ミカンキイロアザミウマ、	遅	長	ドライフロアブル	散布	フロニカミド		
		30	グレーシア乳剤	収穫前日まで	2回以内	2,000倍(100~300g)	50ml	コナジラミ類、アザミウマ類、ハダニ類、ハモグリバエ類、オオタバコガ、 ハスモンヨトウ、チャノホコリダニ	速	長	乳剤	散布	フルキサメタミド		
		UN	ブレオフロアブル	収穫前日まで	4回以内	1,000倍(100~300g)	100ml	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ミナミキイロアザミウマ、 ハモグリバエ類	中	長	フロアブル	散布	ピリダリル		
		—	サンクリスタル乳剤	収穫前日まで	—	300倍(150~500g) 300~600倍(150~500g)	333ml 333~167ml	アブラムシ類、コナジラミ類 ハダニ類、チャノホコリダニ、うどんこ病	中	短	乳剤	散布	脂肪酸グリセリド		