

## ブルーベリー農薬適用

	品名	散布倍率	使用時期	使用回数	対象病害虫
殺菌・殺虫剤	石灰硫黄合剤	10倍	発芽前	-	越冬病害虫・カイガラムシ類
殺菌剤	ストロビードライフロアブル	3,000倍	収穫14日前まで	2回	灰色かび病・斑点病
	ベンレート水和剤	3,000倍	収穫7日前まで	1回	バルデンシア葉枯れ病・斑点病
殺虫剤	機械油乳剤95	12倍	-	-	カイガラムシ類
	サイアノックス水和剤	1,000倍	収穫30日前まで	2回	マイマイガ・ドクガ
	ダイアジノン粒剤5	6kg/10a	収穫14日前まで	2回	コガネムシ類幼虫
	フェニックスフロアブル	4,000倍	収穫前日まで	2回	ケムシ類
	アディオフロアブル	2,000倍	収穫前日まで	2回	オウトウショウジョウバエ
	スカウトフロアブル	3,000倍	収穫前日まで	2回	オウトウショウジョウバエ・イラガ
	モスピラン顆粒水溶剤	4,000倍	収穫前日まで	1回	オウトウショウジョウバエ
	アカリタッチ乳剤	1,000倍	収穫前日まで	-	ハダニ類
	エクシレルSE	5,000倍	収穫前日まで	3回	オウトウショウジョウバエ・ケムシ類
	バイオトピア	-	発生初期	-	ヒメコガネ幼虫