

セルリー登録農薬適用表

野菜類登録の剤は別ページにまとめてあります。確認して使用してください。

登録内容は2022年9月1日現在

用途	毒劇	FRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
土壌消毒	劇	FRAC M3 IRAC 8	ガスタード微粒剤	播種又は定植21日前まで	1回	30kg	—	萎黄病、一年生雑草	—	—	微粒剤	土壌混和	ダゾメット	

用途	毒劇	FRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時薬量	適用病害虫	予防	治療	剤型	使用方法	成分名	備考
殺菌剤		1	トップジンM水和剤	収穫60日前まで	2回以内	1,500倍(100~300g)	67g	斑点病	○	○	水和剤	散布	チオファネートメチル	
		24、M1	カスミンボルドー	収穫7日前まで	3回以内	1,000倍(100~300g)	100g	軟腐病、斑点病	○	○	水和剤	散布	カスガマイシン、塩基性塩化銅	
		M5	ダコニール1000	収穫21日前まで	2回以内	1,000倍(100~300g)	100ml	斑点病、萎縮炭疽病	○	×	フロアブル	散布	TPN	
		31	スターナ水和剤	収穫14日前まで	3回以内	2,000倍(100~300g)	50g	軟腐病	○	×	水和剤	散布	オキシリニック酸	
		11	アミスター20フロアブル	収穫3日前まで	4回以内	2,000倍(100~300g)	50ml	斑点病	○	○	フロアブル	散布	アゾキシストロピン	
		11	ストロビーフロアブル	収穫前日まで	3回以内	3,000倍(100~300g)	33ml	斑点病	○	○	フロアブル	散布	クレソキシムメチル	
		3	スコア顆粒水和剤	収穫前日まで	3回以内	2,000倍(200~400g)	50g	斑点病	○	○	顆粒水和剤	散布	ジフェノコナゾール	

用途	劇毒	IRACコード	薬剤名	使用時期	使用回数	倍率・使用量(10a当り)	100g調整時薬量	適用病害虫	効果発現性	残効性	剤型	使用方法	成分名	備考
殺虫剤		4A	アクタラ粒剤5	定植時(植穴処理)又は鉢上時(土壌混和)	2回以内	2g/株	—	ナモグリハエ	—	—	粒剤	植穴処理又は土壌混和	チアメトキサム	
	劇	1A	ランネット45DF	収穫30日前まで	2回以内	1,000倍(100~300g)	100g	アブラムシ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ	速	短	顆粒水和剤	散布	メソミル	
	劇	21A FRAC 39	ハチハチフロアブル	収穫30日前まで	2回以内	2,000倍(100~300g)	50ml	アブラムシ類、ナモグリハエ	遅	中	フロアブル	散布	トルフェンピラド	
	劇	13	コテツフロアブル	収穫14日前まで	2回以内	2,000倍(100~300g)	50ml	ヨトウムシ	速	中	フロアブル	散布	クロルフェナビル	
		15	カスケード乳剤	収穫14日前まで	3回以内	4,000倍(100~300g)	25ml	コシジラ類、マハモグリハエ、ハスモンヨトウ	遅	長	乳剤	散布	フルフェノクスロン	
	劇	4A	モスピラン顆粒水溶剤	収穫7日前まで	2回以内	4,000倍(100~300g)	25g	アブラムシ類、ナモグリハエ、アザミウマ類	中	長	顆粒水溶剤	散布	アセタミプリド	
		4A	ダントツ水溶剤	収穫3日前まで	3回以内	2,000~4,000倍(100~300g)	50~25g	アブラムシ類	中	長	水溶剤	散布	クロチアニジン	
						2,000倍(100~300g)	50g	ハモグリハエ類						
		6	アフーム乳剤	収穫7日前まで	3回以内	2,000倍(100~300g)	50ml	オオタバコガ、タバコガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ハモグリハエ類	速	短	乳剤	散布	エマメクテン安息香酸塩	
		6	コロマイト乳剤	収穫3日前まで	2回以内	2,000倍(100~300g)	50ml	ハダニ類	速	短	乳剤	散布	ミルベメクテン	幼虫・成虫・殺卵効果○
		5	スピノエース顆粒水和剤	収穫3日前まで	3回以内	2,500倍(100~300g)	40g	ハモグリハエ類	速	短	顆粒水和剤	散布	スピノサド	
		28	フェニックス顆粒水和剤	収穫前日まで	2回以内	2,000~4,000倍(100~300g)	50~25g	ハスモンヨトウ	速	長	顆粒水和剤	散布	フルベンジアミド	

◆削除農薬(令和4年度中に使用下さい):「アドマイヤーフロアブル」

用途	劇毒	薬剤名	使用時期	10a当り使用量	使用回数	適用雑草	剤型	使用方法	成分名	備考
茎葉除草剤(非選択性)		バスタ液剤	雑草生育期定植前又は畦間処理(収穫7日前まで)	300~500ml(100~150g)	3回以内	一年生雑草	液剤	雑草茎葉散布	グルホシネート	
茎葉除草剤(選択性)		ナブ乳剤	雑草生育期イネ科雑草3~6葉期(但し、収穫28日前まで)	150~200ml(100~150g)	2回以内	一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)	乳剤	雑草茎葉散布又は全面散布	セトキシジム	
土壌処理除草剤		ロロックス	定植後、但し定植7日後まで(雑草発生前)	100~150g(70~150g)	1回	一年生雑草	水和剤	畦間土壌散布	リニユロン	