

すもも・ブルー登録農薬適用表（殺虫・殺菌）

| 用途 | 毒劇 | 薬剤名 | 暦採用 | 剤型 | 使用方法 | JA採用倍率 | 倍率 | 使用時期 | 使用回数 | 対象病害虫 | 成分名 |
|--------|-----|-------------|----------|----------|------|-------------|------------------------|-----------------|----------|------------------------------------|----------------|
| 殺菌殺虫剤 | | 石灰硫黄合剤 | ○ | 液剤 | 散布 | 10倍 | 7~10倍 140倍 | 発芽前 | | 越冬病害虫・カイガラムシ類・ハダニ類・縮葉病 ふくろみ病 | 多硫化カルシウム |
| | 殺菌剤 | | アグレプト水和剤 | ○ | 水和剤 | 散布 | 1,000倍 | 1,000倍 | 収穫30日前まで | 2回 | かいよう病・黒斑病 |
| | | ベルコートフロアブル | ○ | フロアブル | 散布 | 2,000倍 | 2,000倍 | 収穫3日前まで | 3回 | 灰星病 | イミノクタジンアルベシル酸塩 |
| | | ロブラール水和剤 | ○ | 水和剤 | 散布 | 1,500倍 | 1,000~1,500倍 | 収穫前日まで | 3回 | 灰星病 | イプロジオン |
| | | オーシャイン水和剤 | ○ | 水和剤 | 散布 | 3,000倍 | 3,000倍 | 収穫前日まで | 3回 | 灰色かび病・黒星病・灰星病 | オキシボコナゾールフマル酸塩 |
| | | アンビルフロアブル | ○ | フロアブル | 散布 | 1,000倍 | 1,000倍 | 収穫前日まで | 2回 | 灰星病 | ヘキサコナゾール |
| 殺虫剤 | | スプレーオイル | | 乳剤 | 散布 | | 20~50倍 | 発芽前 | | カイガラムシ類 | マシン油 |
| | 劇 | ダイアジノン水和剤34 | ○ | 水和剤 | 散布 | 1,000倍 | 1,000倍 1,000~1,500倍 | 収穫21日前まで | 4回 | シンクイムシ類 アブラムシ類・ハマキムシ類・アメリカシロヒトリ | ダイアジノン |
| | | サイアノックス水和剤 | | 水和剤 | 散布 | | 1,000倍 | 収穫21日前まで | 2回 | アブラムシ類・シンクイムシ類 | CYAP |
| | 劇 | ダースバンDF | ○ | ドライフロアブル | 散布 | 3,000倍 | 3,000倍 | 収穫14日前まで | 2回 | シンクイムシ類・ウメシロカイガラムシ | クロルピリホス |
| | 劇 | モスピラン顆粒水溶剤 | ○ | 顆粒水和剤 | 散布 | 4,000倍 | 2,000~4,000倍 | 収穫前日まで | 3回 | アブラムシ類・シンクイムシ類(カイガラムシ類2,000倍) | アセタミプリド |
| | | サムコルフロアブル10 | ○ | フロアブル | 散布 | 2,500倍 | 2,500~5,000倍 | 収穫3日前まで | 3回 | ケムシ類・ハマキムシ類(シンクイムシ類2,500倍) | クロラントラニリプロール |
| | | ガットキラー乳剤 | ○ | 乳剤 | 散布 | 100倍 | 100倍 | 休眠期(落葉後~萌芽前) | 1回 | コスカシバ・キクイムシ類 | MEP |
| | 劇 | バリアード顆粒水和剤 | ○ | 顆粒水和剤 | 散布 | 4,000倍 | 2,000~4,000倍 | 収穫前日まで | 2回 | アブラムシ類(モモノゴマダラノメイガ・シンクイムシ類4,000倍) | チアクロプリド |
| | | フェニックスフロアブル | | フロアブル | | (200倍) | 200倍 4,000倍 | 開花期まで 収穫前日まで | 1回 2回 | コスカシバ ケムシ類・コスカシバ | フルベンジアミド |
| | 劇 | バイスイロイドEW | | フロアブル | 散布 | 3,000倍 | 3,000倍 | 収穫14日前まで | 2回 | アブラムシ類 | シフルトリン |
| フェロモン剤 | | スカシバコンL | | | | 40~100本/10a | 成虫発生初期~終期 | | コスカシバ | シナンセルア | |

※適用表に記載されている剤型は、商品上の剤型です。