

\* 曆採用欄の空欄は防除曆に記載のない薬剤

## マルメロ登録農薬適用表（殺虫・殺菌）

(R4年11月現在)

用途	毒劇	薬剤名	曆採用	剤型	使用方法	JA採用倍率	倍率	使用時期	使用回数	対象病害虫	成分名	
殺菌 殺虫剤		石灰硫黄合剤	○	液剤	散布	10倍	7~10倍	発芽前		ハダニ類	多硫化カルシウム	
										越冬病害虫・カイガラムシ類		
殺菌剤		ICボルドー412	○	水和剤	散布	30倍	30倍			ごま色斑点病	銅	
		ダニコール1000	○	フロアブル	散布	1,000倍	1,000倍	収穫30日前まで	4回	ごま色斑点病	TPN	
		キノンドー水和剤80	○	水和剤	散布	1,200倍	1,200倍	1,200~2,000倍	収穫14日前まで	4回	ごま色斑点病	有機銅
							黒点病					
		スコア顆粒水和剤	○	顆粒水和剤	散布	2,000倍	2,000倍	収穫7日前まで	3回	ごま色斑点病	ジフェノコナゾール	
トップジンM水和剤	○	水和剤	散布	1,000倍	1,000~1,500倍	収穫前日まで	6回	腐らん病	チオファネートメチル			
殺虫剤		機械油乳剤95	○	乳剤	散布	12倍	12~14倍			カイガラムシ類	マシン油	
		サイアノックス水和剤	○	水和剤	散布	1,000倍	1,000倍	収穫45日前まで	2回	アブラムシ類・シンクイムシ類	CYAP	
		アディオフロアブル	○	フロアブル	散布	1,500倍	1,500倍	収穫14日前まで	2回	シンクイムシ類	ヘルメトリン	
		アカリタッチ乳剤		乳剤	散布		1,000~2,000倍	収穫前日まで		ハダニ類	プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル	

※適用表に記載されている剤型は、商品上の剤型です。